



TITULO

“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” - HUANCAYO – 2017”



UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO

“FRANKLIN ROOSEVELT”

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTRETICIA



**“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-
PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA
E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” - HUANCAYO – 2017”**

TESIS:

Para obtener el título profesional de:

OBSTETRA

PRESENTADO POR:

BACH. DE LA PEÑA MARTINEZ, MIRYAM LISSETHE

HUANCAYO– PERÚ

2017



ASESOR:

MG. CESAR AUGUSTO MALDONADO
GÓMEZ



DEDICATORIA

Dedico este tesis a mi madre “Miryam Martinez Quispe” y hermana “Yoshio De La Peña Martinez” que me vieron crecer y que con sus enseñanza y sus buenos valores han creado en mi sabiduría, honestidad y sinceridad, haciendo que hoy por hoy sea una persona llena de valores y agradezco también a Ysrael Carbajal Carbajal por su apoyo incondicional.

Dedico también a mis abuelos Guillermo Martínez Castañeda y Máxima Quispe por haberme apoyado en toda mi carrera profesional.

A ti Dios, tú que estas presente en cualquier lugar y circunstancia, gracias a ti por todo lo que soy y he logrado ser, te dedico este mi trabajo por apoyarme y guiarme en cada momento de mi vida profesional.



AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar un gran sentimiento de gratitud, a los que hicieron posible la culminación de esta tesis:

A DÍOS, Por guiarme e iluminarme durante mi vida y durante toda mi carrera profesional, por darme fuerzas y las ganas para seguir adelante.

A MI MADRE Y HERMANA, Por el amor y apoyo incondicional que me brinda día a día y por estar siempre conmigo.

A la UNIVERSIDAD ROOSEVELT, y a su plana de docentes y demás profesionales que con sus enseñanzas hicieron posible mi formación profesional.

A LA OBSTETRA FLOR ALAYO CALIZAYA, por ser una persona y profesional extraordinaria que me educo y guio por las sendas del éxito, por tener paciencia al enseñarme a superar las dificultades en todos los aspectos de la vida profesional como también en la vida personal.

A MI ASESOR - MG. CESAR AUGUSTO MALDONADO GOMEZ, por su asesoría permanente, sobre todo por su amistad y sus consejos tan certeros.

A TODAS LA OBSTETRAS, Por contribuir en mi formación profesional transmitiéndome sus conocimientos, experiencias y habilidades para utilizarlo como herramienta en mi vida profesional.

A LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA (2017) quienes colaboraron de manera desinteresada en el estudio.

A TODOS LAS PERSONAS, que han contribuido con un granito de arena para realizarme como profesional.



ÍNDICE

TITULO	1
CARATULA	2
ASESOR	2
DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTO	4
ÍNDICE	5
RESUMEN	8
SUMMARY	9
INTRODUCCIÓN	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	13
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	15
1.2.1. PROBLEMA GENERAL.....	15
1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.....	15
1.3.1. OBJETIVO GENERAL.....	15
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	15
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	16
1.5. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	16



2. MARCO TEÓRICO	18
2.1. ANTECEDENTES.....	18
2.1.1. INTERNACIONALES.....	18
2.1.2. NACIONALES.....	23
2.1.3. LOCALES.....	25
2.1.4. BASES TEÓRICAS DE INVESTIGACIÓN.....	25
2.1.5. MARCO CONCEPTUAL.....	36
2.2. HIPÓTESIS.....	42
2.3. VARIABLES.....	44
2.3.1. TIPOS DE VARIABLES.....	44
3. METODOLOGÍA	45
3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN.....	45
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	46
3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO.....	47
3.4. MUESTRA.....	47
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	48
3.6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.....	48
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	50
5. RESULTADOS	52
6. DISCUSIÓN	72
7. CONCLUSIÓN	74



8. RECOMENDACIONES.....	76
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	77
10. ANEXOS.....	84



RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como problema general , conocer el nivel de conocimiento de las internas de obstetricia que realizan prácticas pre-profesionales en el Hospital Docente Materno Infantil “El Carmen”- 2017, sobre el Análogo Semi-sintético De La Prostaglandina E1(mecanismo de acción, indicaciones, contraindicaciones, efectos colaterales, vías de administración).

El objetivo general en la cual se determina el nivel de conocimiento de las internas de obstetricia sobre el manejo y uso del misoprostol.

Formulamos la hipótesis de investigación, de que las internas de obstetricia conocen el manejo del uso del misoprostol; y la hipótesis nula en la que referimos que dichas internas desconocen sobre el uso y manejo.

El estudio es inductivo, transversal, prospectivo y no experimental, sometiéndose a dicha investigación el 100% de las internas de obstetricia del presente año 2017, para lo cual utilizamos la guía de encuesta.

El misoprostol es conocido como análogo semi-sintético de la prostaglandina E1 y en forma comercial es conocida como cytotec

PALABRAS CLAVE: Misoprostol, Análogo Semisintético De La Prostaglandina E1, conocimientos, usos.



SUMMARY

The present research work has as a general problem, to know the level of knowledge of the interns of obstetrics who perform pre-professional practices in the Maternal and Child Teaching Hospital "El Carmen" - 2017, on the Semi-Synthetic Analog of Prostaglandin E1 (mechanism of action, indications, contraindications, side effects, administration routes).

The general objective in which the level of knowledge of obstetric interns about the management and use of misoprostol is determined.

We formulated the research hypothesis, that obstetric interns know the use of misoprostol; and the null hypothesis in which we refer that said inmates do not know about the use and management.

The study is inductive, cross-sectional, prospective and non-experimental, with 100% of obstetric interns of this year 2017 undergoing this research, for which we use the survey guide.

Misoprostol is known as semi-synthetic analogue of prostaglandin E1 and in commercial form is known as cytotec
KEY WORDS: Misoprostol, Semi-Synthetic Analog of Prostaglandin E1, knowledge, uses.



INTRODUCCIÓN

El misoprostol es un análogo semi-sintético de la prostaglandina E₁ (PGE₁), utilizado para la prevención y tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales.

Su efecto es directo sobre las células enterocromafines o de Kulchitsky (las cuales liberan histamina), inhibiendo su secreción. También aumentan la secreción de moco y bicarbonato en el estómago por un incremento de la irrigación de la mucosa. El misoprostol también reduce la pepsina en condiciones basales.

El misoprostol comenzó a ser vendido en las farmacias de América latina desde fines de la década de 1980 con el nombre comercial de Cytotec. La pastilla también recibe el nombre de Misoprostol, Cytotec o Misotrol, cada tableta contiene 200mcg de misoprostol.

El misoprostol no debe administrarse durante el embarazo porque induce contracciones uterinas y por tanto, tiene un potencial abortivo.

Entre las reacciones adversas registradas tenemos: diarrea, dolor abdominal, náuseas, flatulencia, dispepsia, cefalea, vómito, estreñimiento y mareo.

Un porcentaje de nuestra sociedad no prevé el riesgo de embarazo en sus relaciones; sin embargo ocurre una serie de situaciones de emergencia que conducen a la búsqueda de alternativas para culminar con un embarazo no deseado.

En estas circunstancias, en nuestro medio se ha detectado que recurren al misoprostol como una alternativa accesible para este fin; pero que no cuentan con información sobre los principios activos, mecanismos de acción, reacciones



adversas, etc. del producto, que favorezca su uso adecuado y seguro en estas circunstancias.

Conceptualmente la inducción al trabajo de parto, consiste en desencadenar sus fenómenos fisiológicos después de las 22 semanas de gestación; para producir el parto normal y espontáneo, estimulando artificialmente las contracciones uterinas que conducen al borramiento, dilatación del cuello uterino y posteriormente el parto.

En ningún país se considera la interrupción del embarazo como un método de planificación familiar. En nuestro país el aborto es ilegal.

El objetivo de esta investigación ha sido evaluar el nivel de conocimiento de las internas de obstetricia sobre el misoprostol, mediante este estudio poder determinar si conocen o no de dicho medicamento ya mencionado. Y también nos permite saber si lo están usando correctamente para evitar los efectos materno-perinatales.

El misoprostol se utiliza para facilitar el parto, habiéndose publicado guías específicas de utilización. Sin embargo, no se debe utilizar en caso de estrés fetal, ruptura de placenta, placenta previa o hemorragias vaginales de origen desconocido. Tampoco se debe emplear en casos de partos múltiples o en presentaciones anormales del feto. Durante el parto, se deben monitorizar los signos vitales de la madre y del feto, así como la intensidad y frecuencia de las contracciones.

La evidencia científica, plantea que el misoprostol es un fármaco útil en el tratamiento de aborto retenido y de feto muerto in útero; y en profilaxis y



tratamiento de hemorragia posparto. Con evidencia de nivel II se encuentra la utilización del misoprostol para la inducción de parto a término y Pretérmino



CAPITULO I

I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

1.1.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Se conoce que en el Perú se produce aproximadamente un millón de embarazos al año, de los cuales un tercio termina en aborto ; de los 630 mil nacimientos que ocurren, se considera que la mitad son resultado de un embarazo no deseado. Esta condición obliga a estas mujeres a llevar la gestación con desdén, sin enfatizar en los cuidados que su estado amerita, contribuyendo de esta manera a una mayor morbilidad y mortalidad materna y perinatal. (1)

El Misoprostol, es un análogo semi-sintético de la prostaglandina E1, está constituido por partes equivalentes de dos isómeros en equilibrio. (2)

El misoprostol se está usando por los médicos en todo el mundo, en una encuesta aplicada sobre el empleo del misoprostol, las respuestas fueron: evacuación uterina en caso de feto muerto intra-útero (61%), en abortos retenidos (57%) y para inducir el parto (46%). Varias características particulares del fármaco le confieren esa alta tasa de utilización, su fácil almacenamiento, los bajos costos y las diversas formas de administración, reconociéndose que hay limitaciones en la aprobación de todas sus indicaciones terapéuticas en la mayoría de los países y no en todas las instituciones hospitalarias ha sido protocolizado su empleo, por ello debe oficializarse su uso apropiado con el propósito de reducir sus complicaciones. (2)

De 1000 mujeres que empiezan a usar misoprostol y no logran interrumpir su embarazo, 10 podrían tener fetos con anomalías. El misoprostol no es tóxico, lo que sucede es que este medicamento hace que el útero se contraiga, y las contracciones uterinas producen un menor aporte del oxígeno al feto. (7)

Las investigaciones han demostrado que la eficacia está entre 80% a 90% en mujeres hasta las 12 semanas de embarazo. Esto quiere decir que de 100 mujeres que usan esta pastilla, 80 a 90 lograrán expulsar de manera completa todo el producto del embarazo, sin que se necesite un procedimiento quirúrgico o "limpieza" (mediante aspiración o legrado). (8)

No se han encontrado trabajos de investigación que mencionen el nivel del conocimiento sobre el análogo semi-sintético de la prostaglandina



E1, y mucho menos cuanto conocen las internas de obstetricia respecto a este fármaco, por lo que nos formulamos la siguiente interrogante.

1.2.- FORMULACION DEL PROBLEMA:

1.2.1.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el uso y efecto materno-perinatal del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1; en las internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” - Huancayo - 2017?

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL:

- Determinar el nivel de conocimiento sobre el uso y efectos materno – perinatal del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1, en las internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” - Huancayo - 2017.

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar el nivel de conocimientos sobre el efecto del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1, en las internas de Obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” - Huancayo - 2017.
- Determinar cuántas internas de obstetricia realizaron el procedimiento del uso del análogo semi-sintético de la



prostaglandina E1, bajo la supervisión del profesional indicado en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” - Huancayo - 2017.

1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

La finalidad de esta investigación es saber el grado de conocimiento de las internas de obstetricia sobre análogo semi-sintético de la prostaglandina E1 (Misoprostol) y para que se usa.

Esta investigación es muy importante porque a través de ello se conocerá el nivel de conocimiento sobre el uso y efecto del análogo Semisintético de la prostaglandina E1, en las internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, para que de acuerdo a los resultados se puedan crear estrategias, de cómo mejorar los conocimientos de las/os internas/os mediante esta investigación.

En cuanto a este estudio se pretende describir los efectos materno-fetales asociados al uso de misoprostol, con el fin de disminuir la morbimortalidad materna - fetal; y establecer pautas que sirvan como evidencia científica que le permitan a las internas de obstetricia tener las herramientas para aplicar mejor el uso del misoprostol siempre con indicación y supervisión del profesional indicado en el servicio de ginecología y de obstetricia.

1.5.- LIMITACIONES:



Se tuvo inconveniente sobre la asesoría, ya que no se cumplió con el tiempo establecido para la revisión y corrección del proyecto (la demora fue de un periodo de 3 meses).



CAPITULO II

II.- MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL:

2.1.- ANTECEDENTES:

2.1.1. INTERNACIONAL:

Autor: Álvaro Moisés De la Vega Vasconcelos/María Nelly Sarantes López. - “Complicaciones materno – fetales asociados al uso de Misoprostol para la inducción de trabajo de parto en embarazos a término, en el servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Bertha Calderón Roque, en el I trimestre del año 2015”. NICARAGUA (2016), Objetivo: Identificar las Complicaciones materno – fetales asociados al uso de Misoprostol para la inducción de trabajo de parto en embarazos a término en el servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital



Bertha Calderón Roque. Dentro su Resultado: El grupo etéreo que predominó fue el de 20 a 35 años. Procediendo del casco urbano en su mayoría, con un nivel de escolaridad medio que correspondía a la educación secundaria. Los antecedentes Gineco-obstétricos del grupo de mujeres en estudio revelaron que el mayor porcentaje de estas, eran multíparas y predominaban las que tenían entre 39 a 40 semanas de gestación. La mayoría de las pacientes necesitaron más de tres dosis de misoprostol para crear condiciones cervicales favorables, con evolución satisfactoria de la vía vaginal. (10)

Autor: Karen Katuska Vivas Micolta/Rafael Leonardo Yanchapanta Galora - "Uso De Misoprostol Para Inducto-Conducción Del Trabajo De Parto En Embarazos A Términos Asociado A Complicaciones Materno Fetales En Pacientes Que Acuden Al Centro Obstétrico Del Hospital Docente Ambato" - ECUADOR (Quito) - (2014). Objetivo: Determinar los factores de riesgo maternos-fetales asociados a la administración de misoprostol para Inducto - conducción del trabajo de parto en pacientes con embarazo a término que acuden al HPDA. Resultado: De 250 pacientes que se administró misoprostol para Inducto - conducción en el trabajo de parto que acudieron al Hospital Provincial Docente Ambato 152 pacientes (61%) terminaron en cesárea. En las complicaciones fetales el sufrimiento fetal agudo es la principal complicación en un 23%, seguida con líquido meconial en un



21%, también está la asfixia neonatal en un 11% (28), el Distress respiratorio en un 8 % y aquellos que no presentaron complicación fue del 37%. (11)

Autor: Karen Johanna Pasquel Moran - "Maduración Cervical con Misoprostol en Pacientes Adolescentes de 11 - 17 años con Embarazo A término, Más Trabajo de Parto con Bishop Menor a 6 - Realizado en la Maternidad "Enrique C. Sotomayor" – GUAYAQUIL - (2012-2013). Objetivo: Demostrar la eficacia, efectividad y seguridad del uso del Misoprostol en la maduración cervical en pacientes adolescentes de 11-17 años con embarazo a término en trabajo de parto con Bishop menor a 6 ingresadas al área quirúrgica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Resultados: En el gráfico observamos que el 87% fueron gestantes nulíparas y el 13% pacientes Secundigesta con embarazos a término inducidas con misoprostol en trabajo de parto con bishop < 6. En las historias clínicas seleccionadas no hubo ninguna paciente a término con más de tres embarazos de más de 17 años. En otro gráfico muestra que la inducción con misoprostol en trabajo de parto en las mujeres con embarazo a término fue mayor en adolescentes de 16 a 17 años con el 50.43%, seguido con las edades de 14 y 15 años con el 45.22%, la diferencia fue baja entre los 11 a 13 años con 4.34%. (12)



Autor: Dr. Pablo Barberoa/Dra. Rosa Liascovicha/Dra. Rita Valdezb/Dra. Angélica Morescoa - “Efecto teratogénicos del misoprostol” – ARGENTINA - (2011). Objetivo: Estimar el riesgo de anomalías congénitas en niños expuestos prenatalmente al misoprostol y conocer su forma de consumo durante la gestación. Resultado: entre las mujeres expuestas al misoprostol solo el 8.2% lo compró con receta; el 81.5% se enteró de su efecto abortivo por una amiga, vecina o pariente; la dosis promedio fue 1439 µg; el 77.2% lo usó tanto por vía oral como vaginal; la edad gestacional promedio de consumo fue a los 48.5 días y el 35.2% empleó un agente abortivo adicional. Las mujeres expuestas al misoprostol presentaron una frecuencia significativamente mayor de abortos (expuestas: 17/94= 18.1%; no expuestas; 29/401= 7.2%; RR= 2.27; IC 95%:1.30-3.98), y de descendencia con anomalías congénitas mayores (expuestas: 5/77= 6.49%; no expuestas: 8/372= 2.15%; RR= 3.02; IC 95%:1.02-8.98). Los cinco niños malformados prenatalmente expuestos al misoprostol presentaron: 1) Encefalocele y defectos transversales de miembros; 2) Porencefalia; 3) Malformación pulmonar adenomatosa quística; 4) Encefalocele occipital y 5) Mal rotación intestinal. (13)

Autor: Dr. Antonio Pardo Novak - Gineco-obstetra/Dra. Gabriela Terceros Berrios/Dra. Litzzy M. Méndez Delgadillo -“Uso Del Misoprostol Oral, Sublingual Y Vaginal Como Inducción En El



Trabajo De Parto, En Embarazos De Término Con Feto Vivo Y Rotura Prematura De Membranas Setiembre” - BOLIVIA (COCHABAMBA) - 2010. Objetivo: Determinar la eficacia y la seguridad del uso de misoprostol administrado por vía oral, sublingual o vaginal para la inducción del trabajo de parto en pacientes con embarazo de término y feto vivo con rotura prematura de membranas. Resultado: Las pacientes que desarrollaron Dinámica Uterina efectiva en un tiempo de 1-2 horas fue del 60% de las del grupo A "Sublingual", del 33,3% de las del grupo C" Oral", del 6,7% de las del grupo B Vaginal y ninguna del grupo control. Todas las pacientes del grupo A-sublingual necesitaron sólo una dosis de misoprostol hasta el nacimiento del producto. El 60% de las pacientes del grupo C-oral y el 53% de las pacientes del grupo B-vaginal, necesitaron una 2o dosis hasta el nacimiento del producto. (14)

Autor: Leonardo David Micolta Salas - “Eficacia Y Seguridad Del Misoprostol Intravaginal Previo Al Legrado Instrumental En El Aborto Diferido E Incompleto, Hospital Docente De Riobamba” – ECUADOR - (2010). Objetivo: Determinar la eficacia y seguridad del misoprostol intravaginal previo al legrado instrumental en aborto diferido e incompleto en pacientes de 15 – 45 años de edad. Conclusión: En un total de 427 pacientes con el diagnóstico de aborto de los cuales 360 pacientes tuvieron un aborto diferido o incompleto y en 317



paciente se utilizó misoprostol para conocer su efectividad y su seguridad. (15)

Autor: Juri Mariuxi Macas Macas - “Frecuencia De Factores Asociados Al Aborto Incompleto En Pacientes Atendidas En El Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel” – GUAYAQUIL - (2013). Objetivo: Determinar la frecuencia de factores asociados al aborto incompleto. Resultados: Muestra del 99,99%(273), de los casos de aborto incompleto con relación a la automedicación con misoprostol representa el 1,46%(4) se auto-medicaron con misoprostol, mientras el 98,53%(269) no se auto-medicaron. Pero aun así y siendo este fármaco de libre adquisición habría que concientizar a la mujer gestante no utilizarlo. (16)

2.1.2. NACIONAL:

Autor: María Esperanza Meléndez Ríos/ Dora María de Jesús Morey Vásquez - “Nivel de conocimiento y actitud sobre el uso de “Misoprostol” en las estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional de San Martín; periodo Julio – Diciembre 2011” - PERÚ (TARAPOTO) - (2012). Objetivo: Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la actitud frente al uso del misoprostol en las estudiantes de obstetricia”. Resultado: En el Gráfico N° 01; se observa que el 95.0% de las estudiantes de obstetricia de la UNSM-T reconocen al misoprostol como abortivo; el 3% de las estudiantes de



obstetricia lo reconocen como inductor del parto; y el 2% de las estudiantes reconocen al misoprostol que se usa para el tratamiento de la hemorragia post parto. En el Gráfico N° 02; se observa que como fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol como abortivo en las estudiantes de obstetricia de la UNSM-T, el 44.65% tiene como fuente de información a los amigos; el 26.78% como fuente de información el Internet; el 14.28% tiene como fuente de información la farmacia. (17)

Autor: Cesar Augusto Huamán Paucar/Cesar Longinos Caracela Núñez -“Eficacia del Misoprostol en Aborto Frustrado y Gestación no Evolutiva en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins Es Salud (1998 – 1999)” - PERU (LIMA) - (2002). Objetivo: Evaluar la eficacia del misoprostol en aborto frustrado y gestación no evolutiva. Resultado: La edad materna de los 608 casos estudiados fue en la mayoría (31.58%) de 30-34 años (192 casos), en aborto frustrado fue de (30.16%) con (76 casos), seguido del grupo etareo de 35-39 años en los que estuvieron el 23.68%(114 casos) de los cuales 25.40%(64 casos) en aborto frustrado y 22.47%(80 casos) en gestación no evolutiva de la población, en tercer lugar estuvieron las gestantes de 25-29 años que correspondieron 21.71% (132 casos; 17.46%(44 casos) en aborto frustrado y 24.72% (88 casos) en gestación no evolutiva. (18)



Autor: Wilfredo Arturo Galan Fiestas - “Complicaciones Materno – Perinatales por el uso del Misoprostol en la Maduración Cervical en Gestantes de 41 Semanas en el Hospital Nacional Docente Madre San Bartolomé Niño Durante el Periodo de Enero a Junio del 2003” - PERU (LIMA) - (2005).Objetivo: Identificación de las complicaciones materno-perinatales asociados al uso de misoprostol como madurador cervical en gestantes de 41 semanas. Resultado: En lo que respecta a las complicaciones maternas: 36 gestantes (37.5%) tuvieron taquisistolia, 17 (17.7%) presentaron endometritis, 14 (14.6%) padecieron de atonía uterina, 13 (13.5%) sufrieron de síndrome de hiperestimulación, 06 desarrollaron hipertensión (6.3%) y 01 (1.1%) desprendimiento prematuro de placenta.En lo referente a las complicaciones perinatales: 07 neonatos desarrollaron síndrome de aspiración meconial (7.3%), 05 tuvieron estrés fetal (5.2%), 03 presentaron distrés fetal (3.3%), sólo uno se complicó presentando depresión neonatal (1.1%).

(19)

2.1.3. LOCAL:

No se cuenta con estudios científicos orientados sobre nuestro problema en nuestra región Junín.

2.1.4.- BASES TEÓRICAS:

El misoprostol es un análogo semi-sintético de la prostaglandina E1, utilizado para la prevención y tratamiento de



las úlceras gástricas y duodenales, en particular las secundarias al empleo de fármacos anti-inflamatorios no esteroídicos (AINES). El misoprostol es algo menos efectivo que los antagonistas H₂ de histamina, pero más eficaz que el sucralfato en el tratamiento de las úlceras activas gástricas y duodenales. (4)

A mediados de los 80 el Misoprostol (un metilo análogo de la PgE₁) se comenzó a usar en ginecología y obstetricia luego de ser aprobado por la Agencia Federal de Alimentos y Droga (FDA) para el tratamiento de la dispepsia (Grupo de síntomas que se originan de una disfunción del tracto gastrointestinal).

En 1992 la PgE₂ (dinoprostone) fue aprobada por la FDA para su uso en la maduración cervical. Actualmente el Misoprostol es uno de los principales medicamentos utilizados para: aborto médico, la maduración del cuello uterino, la inducción del parto. (25)

Gran variedad de estudios científicos en todo el mundo han demostrado la efectividad en inducir cambios cervico-uterinos, ya desde los años 80's se incrementó su uso para abortos clandestinos en América. De igual manera se debe reconocer el papel trascendental en la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad materna asociadas al aborto inseguro.

Se reconoce que el misoprostol logra un estímulo uterino capaz de provocar contracciones uterinas, por ello muchas investigaciones orientaron la indicación médica para la inducción del trabajo de parto o inducción del aborto retenido, con feto muerto, así como en los casos de inducción del parto con feto vivo o de igual manera para la interrupción precoz del embarazo.(26)

MECANISMO DE ACCIÓN:

PROTECTOR GÁSTRICO:

Inhibe la secreción acidopéptica al bloquear el receptor prostaglandínico tipo E localizado en las células parietales gástricas.

El misoprostol desarrolla una acción citoprotectora de la mucosa gástrica, fenómeno plenamente demostrado mediante los controles endoscópicos gastroduodenales en sujetos tratados con diferentes antiinflamatorios no esteroides (aspirina, piroxicam, diclofenac, naproxeno).

En la actualidad se han desarrollado algunos productos que asocian un AINE + misoprostol, destinado al tratamiento de pacientes reumáticos con patologías acidopépticas (gastritis, úlcera gastroduodenal), que no pueden tomar antiinflamatorios debido a su acción gástrica lesiva. Se administra por vía oral, se absorbe en el tracto



gastrointestinal y se metaboliza rápidamente (oxidación) para transformarse en metabolitos activos (misoprostol ácido). La administración con los alimentos reduce su índice de absorción. La vida media de eliminación es de 20-40 minutos y se excreta principalmente por la orina. El misoprostol es en términos relativos, metabólicamente resistente y por tanto tiene una acción prolongada. Con este derivado prostaglandínico se han informado casos de malformaciones congénitas, por lo que su empleo está contraindicado durante el embarazo. En tratamientos prolongados se aconseja realizar controles periódicos de la actividad hematopoyética. La mujer en edad fértil debe evitar el embarazo mientras esté recibiendo misoprostol.(27)

EN GINECOLÓGIA:

Las prostaglandinas son ácidos grasos que se producen de manera natural en muchos tejidos corporales. El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1. La prostaglandina E1 produce contracciones miométriales al interactuar con receptores específicos en las células miométriales.

Esta interacción produce una cascada de eventos, incluyendo cambios en la concentración de calcio lo que inicia la contracción muscular.

El misoprostol, al ser un análogo de la prostaglandina E1,



interactúa con los receptores de prostaglandina, suaviza la cervix y el útero se contrae, lo que trae consigo la expulsión de los contenidos uterinos. (27)

FARMACOCINÉTICA

El misoprostol se puede administrar oralmente, absorbiéndose extensa y rápidamente (88%). La administración concomitante de anti-ácidos y de alimentos reduce y retrasa la absorción. El fármaco también se absorbe muy bien cuando se administra por vía intravaginal.

El misoprostol experimenta una extensa metabolización de primer paso produciendo el metabolito más importante y activo, el ácido misoprostólico. Al parecer, este tipo de metabolismo también tiene lugar en el interior de la célula parietal. (4)

La inhibición de la secreción gástrica de ácido se inicia a los 30 min después de una dosis oral, alcanzando su valor máximo a los 60-90 min. La duración y la intensidad de la inhibición gástrica de ácido son dosis-dependientes, alcanzando su valor máximo con la dosis de 400 µg.

La semi-vida de eliminación del misoprostol es de unos 20-40 min, aumentando a 80 min en los pacientes con disfunción renal. Menos del 1% de la dosis es eliminada en la orina sin metabolizar. (4)



VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

El misoprostol al ser administrado oralmente es rápida y extensivamente absorbido (88%). Los alimentos y antiácidos disminuyen la tasa y cantidad de la absorción. Por la vía oral, la concentración plasmática de misoprostol se eleva rápidamente, llegando al máximo entre los 12,5 y 60 minutos después de la administración, y a su nivel más bajo después de 120 minutos. Consecuentemente, el tono uterino inicia su elevación alrededor de los 8 minutos y alcanza su máximo cerca de los 26 minutos. (2 - 28)

Un estudio encontró contractilidad uterina solamente en cerca del 40% de las mujeres, durante un período de observación de cuatro horas. Considerando la rápida reducción de los niveles plasmáticos de la droga, los intervalos entre dosis podrían ser tan cortos como cada 2 ó 3 horas, cuando se administra por la vía oral.

Vía Vaginal

La biodisponibilidad del misoprostol, por la vía vaginal, es tres veces mayor que por la vía oral. Después de la administración vaginal la concentración plasmática de misoprostol se eleva gradualmente, alcanzando el pico máximo entre los 60 y 120



minutos, y declina lentamente, llegando hasta un 61% del nivel máximo, 240 minutos después de la administración.

Los niveles plasmáticos permanecen relativamente estables por lo menos hasta seis horas después de su administración. Además, cuando se añade agua a la tableta de misoprostol administrado por la vía vaginal, los niveles séricos permanecen más elevados, hasta seis horas después de la administración.

(2 - 28)

Vía Sublingual

Cuando se administra por la vía sublingual, la curva de concentración plasmática es semejante a la vía oral, pero en niveles más elevados, lo que da como resultado un área bajo la curva bastante mayor. Así mismo, se observa un significativo incremento del tono uterino a los 10 minutos de la administración sublingual del misoprostol.

Parece claro que esta propiedad tendría la ventaja de hacer que la vía sublingual sea apropiada para situaciones donde se desean niveles plasmáticos más elevados, y en corto período de tiempo.

Este es el caso, por ejemplo, de la prevención, o aún más, del tratamiento de la hemorragia puerperal, pero también en la inducción del aborto, aborto incompleto o preparación cervical para instrumentación intrauterina. En todos esos casos una



acción más temprana, especialmente sobre el tono uterino, es necesaria. (2 - 28)

Vía rectal:

El estudio del uso de misoprostol para la hemorragia post parto, demuestra que este medicamento también es efectivamente absorbido, cuando es administrado por vía rectal. El pico máximo de concentración se alcanza alrededor de los 40 minutos y declina lentamente, llegando como mínimo al doble de la concentración plasmática por la vía oral a los 240 minutos (4 horas). (2)

CONTRAINDICACIONES

El misoprostol se clasifica dentro de la categoría “X” de riesgo en el embarazo. Este fármaco produce contracciones uterinas, desplazamientos del feto y otros problemas durante el embarazo, que pueden provocar abortos y la hospitalización de la paciente. Si una paciente quedara embarazada durante un tratamiento con misoprostol, el fármaco debe ser inmediatamente suspendido. También son posibles efectos teratogénicos (4)

La utilización del misoprostol en mujeres por cesáreas o cirugía uterina está contraindicada debido al riesgo de una rotura de útero.

Se han comunicado serias reacciones adversas durante el uso del misoprostol en mujeres embarazadas, incluyendo la muerte de la madre o del feto. La hiperestimulación uterina, o la ruptura del útero pueden hacer necesaria una intervención quirúrgica, histerectomía o salpingooforectomía.

Además, pueden producirse embolismos del líquido amniótico, hemorragias vaginales, retención de placenta, shock, bradicardia fetal y dolor pélvico.

El misoprostol puede exacerbar la inflamación intestinal y producir diarrea en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que se debe emplear con precaución es estos enfermos. La diarrea inducida por el misoprostol puede producir una deshidratación.

En los pacientes con insuficiencia renal la semivida de eliminación del misoprostol está aumentada, si bien no parecen ser necesarios reajustes en las dosis. Sin embargo, en casos de intolerancia, puede ser necesaria una reducción de la dosis.

(4)

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS:(1)

- Pacientes con asma
- Situación Transversa
- Placenta Previa Central total
- Cesáreas previas

- Embarazo múltiples con primer feto en transversa
- Antecedentes de hipersensibilidad al medicamento.
- DCP
- Estreches pélvica
- Macrosomia fetal
- Distocia de presentación cefálico
- Presentación Podálica

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS:(1)

- Oligohidramnios
- Preeclampsia
- Cirugía previa (legrados uterinos)

INTERACCIONES (4)

La administración de antiácidos conteniendo magnesio puede exacerbar la diarrea inducida por el misoprostol. Por lo tanto, en caso de ser necesario un antiácido durante un tratamiento con misoprostol, se debe optar por uno que contenga aluminio.

Algunos estudios realizados en animales sugieren que el aumento del flujo renal producido por el misoprostol incrementa la filtración glomerular, la excreción de sodio y el flujo urinario. Sin embargo, en los estudios clínicos, el misoprostol aumentó ligeramente la nefrotoxicidad inducida por la ciclosporina aunque redujo de forma significativa la incidencia de rechazos.



Existe el riesgo de una hipertensión uterina si se administran concomitantemente Oxitocina y misoprostol, por lo que se recomienda discontinuar la administración de oxitocina hasta después de la última dosis de misoprostol.

Si fuese absolutamente precisa la administración de ambos fármacos, esta se deberá realizar bajo una cuidadosa supervisión para asegurar que se consigue una dilatación cervical adecuada.

EFFECTOS ADVERSOS (30)

- SOBRE LA MADRE:

- Náuseas
- Vómito
- Fiebre
- Hipertensión uterina
- Hiperestimulación y taquisistolia

- SOBRE EL FETO:

- Taquisistolia
- Sufrimiento fetal
- Defecto en las extremidades superiores e inferiores
- Hidrocefalia
- Síndrome de mobius (parálisis facial).



TERATOGENIA:

El uso de misoprostol está contraindicado en el embarazo por su gran potencial como abortivo y su relación con diversas malformaciones como microcefalia, síndrome de Moebius, pie equinovaro, entre otras.

Presentamos dos recién nacidos de término, con antecedente de ingesta de misoprostol por la madre en el primer trimestre, con malformaciones evidentes al nacimiento. El uso de misoprostol en países donde el aborto es ilegal, incrementa el mal uso del mismo con la consecuente aparición de diversas malformaciones congénitas. Es importante la difusión y el conocimiento de los efectos teratogénicos de dicho medicamento, así como el control en el uso del mismo.

A continuación se describe el caso de un recién nacido afectado de SM, cuya madre uso misoprostol con fines abortivos durante el primer trimestre de la gestación. (29)

2.1.5.- MARCO CONCEPTUAL:

GASTRITIS CRÓNICA: Es una inflamación del revestimiento del estómago que se presenta gradualmente y que persiste durante un tiempo prolongado.

ULCERA GÁSTRICA: Es una erosión o herida en la mucosa del estómago (úlcera gástrica) o en la parte superior del



intestino delgado, llamada duodeno (úlcera duodenal). Las úlceras suelen tener un tamaño entre 0.5 y 1.5 cm de diámetro.

ATONÍA UTERINA: Es el término en obstetricia que se refiere a la pérdida del tono de la musculatura del útero que conlleva a la ausencia de contracción del mismo y un consecuente retraso en su involución tras el parto. Cuando la madre expulsa al bebé y a la placenta, se desencadena un mecanismo de suma importancia: se trata de una potente contracción uterina cuya función es el cierre de los vasos sanguíneos del útero. Gracias a esta contracción, el sangrado es mínimo en la madre.

Cuando este mecanismo no se produce, se origina la atonía uterina o inercia y el resultado es una importante hemorragia con presencia de hematoma en labios superiores y un intenso dolor con acumulación de coágulos internos.

HEMORRAGIAS POST-PARTO: Es la pérdida de más de 500 ml de sangre después de un parto vaginal o más de 1000 ml de sangre después de una cesárea, en las primeras 24 horas del puerperio. La hemorragia postparto es la causa más importante de hemorragia en el puerperio, la principal causa de muerte materna perinatal en países desarrollados y una causa principal de morbilidad a nivel mundial.



La hemorragia posparto puede ser dividida en 2 tipos: la hemorragia postparto temprana, que ocurre dentro de las primeras 24 horas del parto, y la hemorragia postparto tardía, que ocurre 24 horas a 6 semanas después del parto.

La mayoría de los casos de hemorragia posparto, superior al 99%, son tempranas.

ABORTO: Interrupción del embarazo, con o sin expulsión, parcial o total del producto de la concepción, antes de las 22 semanas o con un peso fetal menor de 500 gr.

>**Aborto Frustrado**

La retención del embrión en la cavidad uterina por lo menos durante 4 semanas después de su muerte, se conoce como aborto frustrado. Definir el tiempo entre la muerte y el diagnóstico no es fácil y carece de utilidad práctica porque en la actualidad el diagnóstico se realiza con prontitud. De acuerdo con la edad gestacional, la paciente observará primero que los movimientos fetales han desaparecido, que el crecimiento uterino se detiene y que posteriormente disminuye, los cambios mamarios propios del embarazo regresan y el sangrado es escaso, de color café negruzco, el cual persiste por varios días. No es posible determinar la FCF.



>Aborto Séptico

Es el aborto completo o incompleto acompañada de infección, la cual se puede manifestar por fiebre, flujo sanguinolento o purulento y dolor hipogástrico. La mayoría de las pacientes ingresan a los hospitales con el antecedente de una maniobra abortiva. El aborto séptico representa un grave problema por su elevada incidencia y por las complicaciones que produce.

ANALOGO SEMISINTETICO DE LA PROSTAGLANDINA

E1 (MISOPROSTOL): Es un análogo semi-sintético de la prostaglandina E₁ (PGE₁). Es un medicamento seguro y eficaz para el aborto hasta la semana 12 de embarazo. Es un medicamento que no se acumula en el cuerpo de las mujeres ni causa daño a su fertilidad.

ANÁLOGO: Se emplea para calificar a aquello que dispone de analogía con otra cosa. El concepto de analogía, por su parte, se refiere al vínculo de semejanza que existe entre dos elementos diferentes.

SEMISINTÉTICO: Que se obtiene de elementos naturales mediante un proceso de síntesis química.

PROSTAGLANDINAS: Son un conjunto de sustancias de carácter lipídico derivadas de los ácidos grasos de 20 carbonos, que contienen un anillo ciclopentano y constituyen

una familia de mediadores celulares, con efectos diversos, a menudo contrapuestos.

Se pueden resumir las funciones de las prostaglandinas en cinco puntos:

- Intervienen en la respuesta inflamatoria: vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los tejidos permitiendo el paso de los leucocitos, antiagregante plaquetario, estímulo de las terminaciones nerviosas del dolor, etc.
- Aumento de la secreción de mucus gástrico, y disminución de secreción de ácido gástrico.
- Provocan la contracción de la musculatura lisa. Esto es especialmente importante en la del útero de la mujer. En el semen humano hay cantidades pequeñas de prostaglandinas para favorecer la contracción del útero y como consecuencia la ascensión de los espermatozoides a las trompas uterinas (trompas de falopio).
- Del mismo modo, son liberadas durante la menstruación, para favorecer el desprendimiento del endometrio. Así, los dolores menstruales son tratados muchas veces con inhibidores de la liberación de prostaglandinas.
- Intervienen en la regulación de la temperatura corporal.

- Controlan el descenso de la presión arterial al favorecer la eliminación de sustancias en el riñón.

CONTRACCIONES UTERINAS: El músculo del útero tiene como todos los tejidos formados por fibras musculares, una fase de contracción y otra de relajación. Cuando el músculo uterino se contrae decimos que la embarazada tiene una contracción, y se percibe por el endurecimiento de su abdomen.

CONOCIMIENTO: Es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan mediante la experiencia o la adquisición de conocimientos o a través de la observación.

En el sentido más extenso que se trata de la tenencia de variados datos interrelacionados que al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo.

El conocimiento es la disciplina que se encarga de considerar su validez y la expresión que se identifica como la epistemología que es la rama de la filosofía donde el objetivo de estudio son los conocimientos científicos que no solo debe ser válido y consistente desde el punto de vista lógico, pero además debe comprobado mediante el método científico o experimental.



2.2.- HIPÓTESIS:

2.2.1.- HIPÓTESIS GENERAL:

- Hi: Las internas de obstetricia conocen sobre el manejo del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.
- H0: las internas de obstetricia desconocen sobre el manejo del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.

2.2.2.- HIPÓTESIS ESPECÍFICO:

- Hi: Las internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, tienen el conocimiento del efecto materno-perinatal del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.
- H0: Las internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, no tienen el conocimiento del efecto materno-perinatal del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.
- H2: Más del 50% de las internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, realizan el procedimiento con el análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.



- H0: Menos del 50% de las internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, no realizaron el procedimiento con el análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERATIVA	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
<p>VARIABLE INDEPENDIENTE:</p> <p>Internas de obstetricia</p>	<p>Son todas las estudiantes del último semestre de las diferentes universidades quienes realizan sus prácticas pre-profesionales en el Hospital Regional Docente Marteño Infantil “ El Carmen”</p>	<p>Que la interna de obstetricia utilice adecuadamente y con responsabilidad el análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.</p>	<p>Si usa</p> <p>No usa</p>	<p>Nominal</p>
<p>VARIABLE DEPENDIENTE:</p> <p>Nivel de conocimiento sobre el uso y efecto materno-perinatal del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.</p> <p>VARIABLE INTERVINIENTE:</p> <p>Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”.</p>	<p>Grado de información sobre indicaciones, contraindicaciones, dosis, vías de uso efectos materno – perinatales del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.</p>	<p>Información que disponen las internas de obstetricia sobre indicaciones, contraindicaciones, dosis, vías de uso efectos materno – perinatales del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.</p>	<p>0 – 10 desconocen.</p> <p>11- 20 conocen.</p>	<p>100 %</p>



CAPITULO III

III.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:

3.1.- MÉTODO:

3.1.1. INDUCTIVO:

El método inductivo suele basarse en la observación y la experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar a una resolución o conclusión general sobre estos; es decir en este proceso se comienza por los datos y finaliza llegando a una teoría, por lo tanto se puede decir que asciende de lo particular a lo general.

3.1.2. DESCRIPTIVO:

Un estudio descriptivo es aquél en que la información es recolectada sin cambiar el entorno (es decir, no hay manipulación). En investigación humana, un estudio descriptivo



puede ofrecer información acerca del estado de salud común, comportamiento, actitudes u otras características de un grupo en particular. Los estudios descriptivos también se llevan a cabo para demostrar las asociaciones o relaciones entre las cosas en el entorno.

3.1.3. TRANSVERSAL:

Son diseños observacionales de base individual que suelen tener un doble componente descriptivo y analítico. Cuando predomina el primer componente se habla de estudios transversales descriptivos o de prevalencia, cuya finalidad es el estudio de la frecuencia y distribución de eventos de salud y enfermedad.

3.1.4. PROSPECTIVO:


Los estudios se ubican en el contexto de las instituciones y del futuro; parten de lo real y se proyectan al campo de lo virtual.

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

3.2.1. DISEÑO ESPECÍFICO:

DISEÑO NO EXPERIMENTAL:

Donde:



M: Población de internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”.

X: Niveles de conocimientos sobre el efecto del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.

Y: Uso del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.

r: Relación entre nivel de conocimientos y el uso – efecto materno-perinatal del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1.

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO:

Está conformada por las internas de diferentes carreras (medicina, obstetricia, enfermería) del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, siendo un total de 100 internos.



3.4. MUESTRA:

El muestreo es por conveniencia debido a que se trabajó con el 100% de internas de Obstetricia que participan de la investigación (30 internas) de las cuales son de diferentes universidades como: UNIVERSIDAD ROOSEVELT, UNIVERSIDAD ULADECH, UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES, UNIVERSIDAD PRIVADA DEL CENTRO.

✓ Criterios de inclusión:

- Internas de Obstetricia del HRDMI El Carmen, que se encuentren realizando su internado en el periodo de estudio.

✓ Criterios de exclusión:

- Internos de otras especialidades.

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.-

- TÉCNICA: Encuestas para la recolección de datos.
- INSTRUMENTO: Cuestionario que consta de 20 preguntas, que será revisado por expertos.

3.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN y ANÁLISIS DE DATOS:



- Se procedió a realizar el vaciado de información en el programa estadístico SPSS Statistical Package for Social Sciees, Excel, Power Point.
- Se realizó el análisis y la redacción del informe final de la Tesis.

3.7. MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR.-

Materiales:

- ✓ Hojas
- ✓ Lapiceros
- ✓ Goma
- ✓ Lápiz
- ✓ Folder manila
- ✓ Tijera
- ✓ Tinta para impresora

Equipos:

- ✓ Computadora
- ✓ Internet
- ✓ Impresora
- ✓ Cámara fotográfica
- ✓ Grabadora
- ✓ Celular



CAPITULO IV

IV.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

4.1.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.-

N°	ACTIVIDAD	AÑO 2017																															
		MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SETIEMBRE							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	ELECCION DEL TEMA	x	X	X	X																												
2	ELABORACION DEL PROYECTO					x	X	x	X																								
3	OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN									X	X																						
4	ANÁLISIS DE INFORMACIÓN											x	x																				
5	ELABORACIÓN DEL INFORME EN BORRADOR													x	x	X	X																
6	REVISIÓN DEL INFORME																	X	x	x													
7	CORRECCIÓN DEL INFORME																				x	x	X										
8	PRESENTACIÓN DEL INFORME																							x	x	x							
9	APROBACIÓN DEL INFORME																											X	X				
10	SUSTENTACIÓN																																X

CAPITULO V

V.- RESULTADOS.-


TABLA N° 1

¿CONOCES EL MISOPROSTOL?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
SI	30	100,0	100,0	100,0
NO	0	0	0	0
TOTAL	30	100	100	100

GRÁFICO N° 1

¿CONOCES EL MISOPROSTOL?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al análisis, se puede evidenciar que el 100% de internas de obstetricia encuestadas conocen acerca del misoprostol.


TABLA N° 2

¿CUÁL ES EL TIPO DE CLASIFICACIÓN DEL FÁRMACO (MISOPROSTOL)?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
ANTIBIÓTICO	1	3,3	3,3	3,3
OXITÓCICO	9	30,0	30,0	33,3
ANTIMICÓTICO	0	0	0	0
ANÁLOGO DE LA PROSTAGLANDINA E1	20	66,7	66,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

GRÁFICO N° 2

¿CUÁL ES EL TIPO DE CLASIFICACIÓN DEL FÁRMACO (MISOPROSTOL)?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: Se puede observar con respecto al tipo de clasificación el 66.7% de entrevistadas identifica al misoprostol como el análogo de la prostaglandina E1, en relación al 3.3% que refieren que es antibiótico.


TABLA N° 3

¿CUAL DE LAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DEL MISOPROSTOL, ES LA MAS USADA (Obstetricia)?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
VÍA SUBLINGUAL	4	13,3	13,3	13,3
VÍA RECTAL	7	23,3	23,3	36,7
VÍA ORAL	2	6,7	6,7	43,3
VÍA VAGINAL	17	56,7	56,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

GRÁFICO N° 3

¿CUAL DE LAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DEL MISOPROSTOL, ES LA MAS USADA (Obstetricia)?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico y en la tabla con respecto a las vías de administración del misoprostol, el 56,67% manifestaron que es Vía Vaginal es la más empleada dentro del campo profesional, y un 6.67% que es Vía Oral.


TABLA N° 4

¿CUÁL ES EL EFECTO SECUNDARIOS DEL MISOPROSTOL?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
VÓMITOS/FIEBRE	30	100,0	100,0	100,0
PRURITO	0	0	0	0
TINITUS	0	0	0	0
PÉRDIDA DE PESO	0	0	0	0
TOTAL	30	100,0	100,0	

GRÁFICO N° 4

¿CUÁL ES EL EFECTO SECUNDARIOS DEL MISOPROSTOL?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico y en la tabla, de las 30 internas de obstetricia entrevistadas refieren que los efectos secundarios más comunes del misoprostol son el Vómito y la Fiebre.


TABLA N° 5

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DEL MISOPROSTOL, EN OBSTETRICIA?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
EMBARAZO GEMELAR	25	83,3	83,3	83,3
TRATAMIENTO PARA HEMORRAGIAS POST-PARTO	0	0	0	0
INDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO	3	10,0	10,0	93,3
HIPERTENSIÓN ARTERIAL	2	6,7	6,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

GRAFICO N° 5

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DEL MISOPROSTOL, EN OBSTETRICIA?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el gráfico y en la tabla podemos observar, con respecto a las contraindicaciones del misoprostol, que el 83,33% refieren que no se debe usar en Embarazos Gemelares y con cifras menores indicando a la Hipertensión Arterial con un 6.67% como contraindicación para su uso.


TABLA N° 6

¿CUAL ES EL RIESGO DEL USO DEL MISOPROSTOL EN OBSTETRICIA?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
PROVOCA DOLOR EN EL ESTOMAGO	0	0	0	0
PROVOCA EL ABORTO	30	100,0	100,0	100,0
PROVOCA PLACER SEXUAL	0	0	0	0
PROVOCA ESTRÉS	0	0	0	0
TOTAL	30	100,0	100,0	

GRÁFICO N° 6

¿CUAL ES EL RIESGO DEL USO DEL MISOPROSTOL EN OBSTETRICIA?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el gráfico y en la tabla observamos, con respecto al riesgo del uso del misoprostol en obstetricia, las 30 internas entrevistadas, manifestaron en su totalidad que Provoca el aborto.


TABLA N° 7

¿CUAL ES LA FUENTE PRINCIPAL DE INFORMACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL MISOPROSTOL?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
AMIGOS	1	3,3	3,3	3,3
INTERNET	12	40,0	40,0	43,3
FARMACIAS	2	6,7	6,7	50,0
LIBROS	15	50,0	50,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

GRÁFICO N° 7

¿CUAL ES LA FUENTE PRINCIPAL DE INFORMACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL MISOPROSTOL?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el gráfico y en la tabla N° 7 observamos en cuanto a la fuente principal de información del misoprostol, el 50 % refieren que conocen mediante los Libros y un 3% refieren que dicha información es de los Amigos.


TABLA N° 8

¿UD. HIZO USO DE LA ADMISTRACIÓN DEL MISOPROSTOL EN ABORTOS FRUSTOS CON INDICACION DEL PERSONAL ASISTENCIAL?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
SI	21	70,0	70,0	70,0
NO	9	30,0	30,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

GRÁFICO N° 8

¿UD. HIZO USO DE LA ADMISTRACIÓN DEL MISOPROSTOL EN ABORTOS FRUSTOS CON INDICACION DEL PERSONAL ASISTENCIAL?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico y en la tabla se observa que el 70% de las internas de obstetricia refieren que brindaron administración del misoprostol en Abortos Frustos por indicación del profesional asistencial y el 30% que No realizaron dicho procedimiento.


TABLA N° 9

¿EN CUAL DE ESTAS ALTERNATIVAS SE USA EL MISOPROSTOL, EN OBSTETRICIA?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
CESÁREAS ANTERIORES	2	6,7	6,7	6,7
ESTRECHEZ PÉLVICA	1	3,3	3,3	10,0
TRATAMIENTO DE LAS HEMORRAGIAS POST PARTO	27	90,0	90,0	100,0
EMBARAZO MÚLTIPLE	0	0	0	0
Total	30	100,0	100,0	

GRAFICO N° 9

¿EN CUAL DE ESTAS ALTERNATIVAS SE USA EL MISOPROSTOL, EN OBSTETRICIA?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el gráfico y en la tabla N° 9 del 100% de internas encuestadas, el 90% refieren que el misoprostol sirve para el Tratamiento de Hemorragias post-parto y un 3.3% para casos de Estrechez Pélvica.


TABLA N° 10

¿EN QUE CASOS INDICARÍAS EL MISOPROSTOL?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
EMBARAZO NO PLANIFICADO	1	3,3	3,3	3,3
EMBARAZO POR VIOLACIÓN	11	36,7	36,7	40,0
EMBARAZO CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS	18	60,0	60,0	100,0
EMBARAZO MÚLTIPLE	0	0	0	0
Total	30	100,0	100,0	

GRÁFICO N° 10

¿EN QUE CASOS INDICARÍAS EL MISOPROSTOL?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el gráfico y en la tabla, se observa que el 60% manifestaron que usarían el misoprostol en Embarazos con Malformaciones Congénitas y un 3.3% en Embarazos no planificados.


TABLA N° 11

**LOS ASPECTOS ÉTICO RELACIONADOS AL USO DEL MISOPROSTOL
TE PARECEN:**

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
EXAGERADOS	9	30,0	30,0	30,0
NECESARIOS	15	50,0	50,0	80,0
NO TIENEN IMPORTANCIA	1	3,3	3,3	83,3
POCO RELEVANTES	5	16,7	16,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

GRÁFICO N° 11

**LOS ASPECTOS ÉTICO RELACIONADOS AL USO DEL MISOPROSTOL
TE PARECEN:**



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico y en la tabla, podemos observar con respecto a los aspectos éticos del uso del misoprostol, el 50% refieren que Son Necesarios y un 3,3% manifiestan que No Tienen Importancia.


TABLA N° 12

¿CUAL ES TU OPINIÓN FRENTE AL USO DEL MISOPROSTOL (OBSTETRICIA)?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
TRATAMIENTO ULCERA GÁSTRICAS	15	50,0	50,0	50,0
DEBE SER RETIRADO DEL MERCADO FARMACÉUTICO	6	20,0	20,0	70,0
DEBE SER VENDIDO SIN RECETA MEDICA	9	30,0	30,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

GRAFICO N° 12

¿CUAL ES TU OPINIÓN FRENTE AL USO DEL MISOPROSTOL (OBSTETRICIA)?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico y en la tabla, observamos con respecto a la opinión frente al uso del misoprostol, el 50% refieren que es para Tratamiento De Ulceras y un 20% refieren que debe ser retirado del mercado farmacéutico.


TABLA N° 13

¿UD SE HA ENTERADO DE QUE ALGUIEN HA USADO O INDICADO EL MISOPROSTOL COMO INDUCTOR DEL ABORTO?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
SI	23	76,7	76,7	76,7
NO	7	23,3	23,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

GRAFICO N° 13

¿UD SE HA ENTERADO DE QUE ALGUIEN HA USADO O INDICADO EL MISOPROSTOL COMO INDUCTOR DEL ABORTO?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el gráfico y en la tabla, se puede observar con respecto si las internas de obstetricia conocen personas que usaron el misoprostol como inductor del aborto, el 77% refieren que Si y un 23% refieren que No.


TABLA N° 14

¿EL MISOPROSTOL TIENE COMO UNO DE SUS MECANISMOS DE ACCIÓN LA MADURACIÓN CERVICAL Y REBLANDECIMIENTO DEL CUELLO UTERINO?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
SI	30	100,0	100,0	100,0
NO	0	0	0	0
TOTAL	30	100,0	100,0	

GRÁFICO N° 14

¿EL MISOPROSTOL TIENE COMO UNO DE SUS MECANISMOS DE ACCIÓN LA MADURACIÓN CERVICAL Y REBLANDECIMIENTO DEL CUELLO UTERINO?



FUENTE: I.E.T – 2017

INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico y en la tabla el 100% de internas entrevistadas refieren que el misoprostol, es un medicamento que tiene como mecanismo de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino.


TABLA N° 15

¿UD. BRINDARÍA MAS INFORMACIÓN SOBRE EL MISOPROSTOL, YA QUE LA SOCIEDAD TIENE IDEAS ERRÓNEAS?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
SI	30	100,0	100,0	100,0
NO	0	0	0	0
TOTAL	30	100,0	100,0	

GRÁFICO N° 15

¿UD. BRINDARÍA MAS INFORMACIÓN SOBRE EL MISOPROSTOL, YA QUE LA SOCIEDAD TIENE IDEAS ERRÓNEAS?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el gráfico y en la tabla N° 15, con respecto a que si brindaría información sobre el misoprostol, el 100% de entrevistadas refirieron que Sí.


TABLA N° 16

¿UD. ESTARÍA DE ACUERDO A QUE SE DIERA MÁS INFORMACIÓN DEL MISOPROSTOL, PARA QUE NO HAYA COMPLICACIONES?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
SI	30	100,0	100,0	100,0
NO	0	0	0	0
TOTAL	30	100,0	100,0	

GRÁFICO N° 16

¿UD. ESTARÍA DE ACUERDO A QUE SE DIERA MÁS INFORMACIÓN DEL MISOPROSTOL, PARA QUE NO HAYA COMPLICACIONES?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico y en la tabla, el 100% de las internas de obstetricia encuestadas, refieren que si están de acuerdo que se diera más información sobre el misoprostol.


TABLA N° 17

¿UD. RECOMENDARÍA MISOPROSTOL, ANTES DE LA SEMANA 20 DE GESTACIÓN?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
SI	9	30,0	30,0	30,0
NO	21	70,0	70,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

GRAFICO N° 17

¿UD. RECOMENDARÍA MISOPROSTOL, ANTES DE LA SEMANA 20 DE GESTACIÓN?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el gráfico y en la tabla N° 17, con respecto si recomiendas el misoprostol antes de la semana 20 de gestación, el 70% refiere que No y el 30% refieren que Sí.


TABLA N° 18

¿CUAL ES LA PRESENTACIÓN DEL MISOPROSTOL?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
TABLETAS	29	96,7	96,7	96,7
AMPOLLAS	0	0	0	0
ÓVULOS	0	0	0	0
CAPSULAS	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

GRAFICO N° 18

¿CUAL ES LA PRESENTACIÓN DEL MISOPROSTOL?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico y en la tabla, podemos observar con respecto a las presentación del misoprostol, el 96,7% manifiestan que es en Tabletas y que un 3.3% que es en Capsulas.


TABLA N° 19

¿EN QUE DOSIS VIENE EL MISOPROSTOL?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
200 ug	20	66,7	66,7	100,0
250 ug	10	33,3	33,3	33,3
300 ug	0	0	0	0
400 ug	0	0	0	0
Total	30	100,0	100,0	

GRAFICO N° 19

¿EN QUE DOSIS VIENE EL MISOPROSTOL?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el gráfico y en la tabla, con respecto a la dosis que viene el misoprostol, el 66.7% refieren que es de 200ug y un 33.3% es de 250 ug.


TABLA N° 20

¿CUAL ES EL NOMBRE COMERCIAL DEL MISOPROSTOL?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
CYPROSTOL	0	0	0	0
MISOTROL	3	10,0	10,0	10,0
CYTOTEC	27	90,0	90,0	100,0
MESYGINA	0	0	0	0
Total	30	100,0	100,0	

GRAFICO N° 20

¿CUAL ES EL NOMBRE COMERCIAL DEL MISOPROSTOL?



FUENTE: I.E.T - 2017

INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico y en la tabla, se observa que el 90% de las entrevistadas refieren que el nombre comercial es Cytotec y un 10% refiere que es Misotrol.



CAPITULO VI

VI.- DISCUSION.-

En los resultados de la investigación se constató que el 100 % de las internas de obstetricia son conocedoras del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1. Resultados similares obtuvo MARÍA MELENDEZ RÍOS y MOREY VÁSQUEZ (tarapoto – 2012), quien en su resultado concluyo que el 95.0% de las estudiantes de obstetricia de la UNSM-T reconocen al misoprostol como abortivo; el 3% de las estudiantes de obstetricia lo reconocen como inductor del parto; y el 2% de las estudiantes reconocen al misoprostol que se usa para el tratamiento de la hemorragia post parto. (1)

También encontramos en la pregunta ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?, el 50 % refieren que conocen mediante los Libros, un 40% por internet, 7 % por farmacias y un 3% refieren que dicha información es de los Amigos. Existe similitud de MARÍA MELENDEZ RÍOS y MOREY VÁSQUEZ (tarapoto – 2012), el 44.65%



tiene como fuente de información a los amigos; el 26.78% como fuente de información el Internet; el 14.28% tiene como fuente de información la farmacia.

(1)

Según los resultados de acuerdo a la pregunta ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?, podemos concluir que el 100% de entrevistadas refirieron que Sí. Habiendo una investigación similar MARÍA MELENDEZ RÍOS y MOREY VÁSQUEZ (tarapoto – 2012), que el 64.0 % de las estudiantes de obstetricia de la UNSM-T tienen una actitud favorable al no aconsejar el uso de misoprostol como abortivo; y el 36.0% de las estudiantes tienen una actitud desfavorable al aconsejar el uso de misoprostol como abortivo.



CAPITULO VII

VII.- CONCLUSIONES.-

1. Las internas conocen el manejo del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1, en el 100% de las entrevistadas.
2. El 50% de las internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, realizan el procedimiento con el análogo semi-sintético de la prostaglandina E1 (abortos frustos, hemorragias post-parto, inducción del parto).
3. Con respecto al tipo de clasificación del fármaco el 66,7%, las entrevistadas identificaron al misoprostol como el análogo Semisintético de la prostaglandina E1. Siendo el 3.3% que lo consideren como un antibiótico.
4. En lo referente a las vías de administración las internas entrevistadas refieren que en un 56,67% es más utilizado la vía



vaginal, y dentro de los efectos secundarios el 100% de internas manifestaron que son fiebre y vómitos.

5. Observamos también que la fuente de información más alta con el 50% fue los libros y que en poco porcentaje fueron los amigos. También se observa que el 100% internas entrevistadas conocen que el misoprostol se usa para el tratamiento de las hemorragias post-parto, mas no en embarazos múltiples, estrechez pélvica y cesáreas anteriores.
6. Observamos que un 60% en embarazos con malformación congénita, mientras un porcentaje considerable manifiestan que en embarazos por violación y en embarazos no planificados, con estos resultados podemos decir que las internas de obstetricia que serán futuras obstetras tienen mala ética profesional.



CAPITULO VIII

VIII.- RECOMENDACIONES.-

1. Integrar en los sílabos universitarios en la carrera profesional de obstetricia el tema: uso y efectos del misoprostol.
2. Brindar conocimientos a todos los estudiantes de obstetricia y así fomentar en ellos la investigación de este medicamento por parte de las universidades y específicamente por la universidad Roosevelt.
3. Capacitaciones especializadas sobre el uso de misoprostol en los alumnos de obstetricia – pre internado.
4. Se recomendaría mayores capacitaciones con información científica y actualizada sobre el misoprostol en los internos de obstetricia de todas las universidades, para así complementar o corregir algunas ideas erróneas, antes que se presente una complicación.



CAPITULO IX

IX.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.-

1. Meléndez Ríos, María Esperanza, Morey Vásquez, Dora María De Jesús. Nivel de conocimiento y actitud sobre el uso de “Misoprostol” en las estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional de San Martín. Tesis. Tarapoto: Universidad Nacional de San Martín; 2012.
2. Canaval E, Ortiz L. Uso de Misoprostol en Obstetricia y Ginecología. 3ed. Bolivia: Tecno químicas; 2013.
3. Colectiva por la libre información para las mujeres. Hablemos de aborto y Misoprostol. Lima; 2014.



4. Centro colaborador de la Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica- ANMAT. Vademecum.Argentina; 2015.
5. Faúndes A. Uso del Misoprostol en Obstetricia y Ginecología. 2 ed. República Dominicana: Aníbal Faúndes; 2007.
6. Pardo N, Terceros B, Méndez D. Uso del Misoprostol Oral, Sublingual Y Vaginal Como Inducción En El Trabajo De Parto, En Embarazos De Término Con Feto Vivo y Rotura Prematura De Membranas. Revista Médica, 21 (1),2010.
7. Debates Pendientes en Salud -Sociedad: misoprostol: información y riesgos - uso del misoprostol en obstetricia y ginecología 2007. Disponible en [https:// es.scribd.com/doc/237431125/Hablemos-de-Aborto-y-Misoprostol-Colectiva-Por-La-Libre-Informacion-Para-Las-Mujeres](https://es.scribd.com/doc/237431125/Hablemos-de-Aborto-y-Misoprostol-Colectiva-Por-La-Libre-Informacion-Para-Las-Mujeres).
8. Colectiva por la libre información para las mujeres. Hablemos de aborto y Misoprostol. Lima; 2014.
9. Uso Del Misoprostol Oral, Sublingual Y Vaginal Como Inducción En El Trabajo De Parto, En Embarazos De Término Con Feto Vivo Y Rotura Prematura De Membranas Cochabamba. Revista Médica, (1) 2010.
10. De la Vega Vasconcelos A, Sarantes López M. Complicaciones Materno Fetales asociados al uso de Misoprostol para la inducción de trabajo de parto



en Embarazos a término, en el servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Bertha Calderón Roque, en el I trimestre del año 2015. Tesis. Managua: Recinto Universitario Rubén Dario. Universidad Autónoma de Nicaragua; 2016.

11. Vivas Micolta K, M. Yanchapanta Galora R. Uso De Misoprostol Para Inducto-Conducción Del Trabajo De Parto En Embarazos A Términos Asociado A Complicaciones Materno Fetales En Pacientes Que Acuden Al Centro Obstétrico Del Hospital Docente Ambato” Tesis. Quito: Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador; 2014.

12. Pasquel Moran K. Maduración Cervical con Misoprostol en Pacientes Adolescentes de 11 - 17 años con Embarazo A término, Más Trabajo de Parto con Bishop Menor a 6 - Realizado en la Maternidad "Enrique C. Sotomayor – Guayaquil – Tesis / 2012-2013.

13. Barbero P, Liascovich R, Valdez R. Efecto teratogénicos del Misoprostol: Un estudio prospectivo en Argentina. 109 (3), 2011.

14. Uso Del Misoprostol Oral, Sublingual Y Vaginal Como Inducción En El Trabajo De Parto, En Embarazos De Término Con Feto Vivo Y Rotura Prematura De Membranas Bolivia. Revista Médica, 2010.

15. Micolta Salas, Leonardo David. Eficacia Y Seguridad Del Misoprostol Intravaginal Previo Al Legrado Instrumental En El Aborto Diferido E



Incompleto, Hospital Docente De Riobamba. Tesis. Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; 2010.

16. Macas Macas J. Frecuencia de Factores Asociados al Aborto Incompleto en pacientes atendidas en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel en el Lapso del 6 de septiembre del 2012 a febrero 2013. Tesis. Ecuador: Universidad de Guayaquil; 2013.

17. Meléndez Ríos M, Morey Vásquez D. Nivel De Conocimiento Y Actitud Sobre El Uso De “Misoprostol” En Las Estudiantes De Obstetricia De La Universidad Nacional De San Martín –Tarapoto; Julio – Diciembre 2017. Tesis. Tarapoto: Universidad Nacional de San Martín; 2017.

18. Huamán Paucar C, Caracela Núñez C. Eficacia del Misoprostol en Aborto Frustrado y Gestación no Evolutiva en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martens Essalud Lima enero 1998-1999. Tesis. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2002.

19. Galán Fiestas W. Complicaciones Materno Perinatales por el uso del Misoprostol en la Maduración Cervical en Gestantes de 41 Semanas en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé durante el periodo enero a junio del 2003. Tesis. Lima: Universidad Mayor de San Marcos; 2005.



20. Dr. Rodríguez Cárdenas A, Dr. Velasco Boza A. Uso de 600 mg. De misoprostol para inducir el aborto temprano. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología.29 (1); 2003.
21. Cavieres M. Toxicidad del misoprostol sobre la gestación. Revisión de la literatura. Revista Médica de Chile. 139 (4); 2011.
22. Misoprostol en la interrupción temprana del embarazo en pacientes adolescentes. CUBA (ciudad de habana).Revista de Obstetricia y Ginecología; 2010.
23. MsC. Nápoles Méndez D. Experiencia con el uso del misoprostol en la pre inducción e inducción del parto. Revista Cubana de Obstetricia Y Ginecología. 33 (3); 2007.
24. Gutiérrez Ramos M, Guevara Ríos E. Controversias en el tratamiento del aborto incompleto, AMEU versus tratamiento médico con misoprostol. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. 61 (1); 2015.
25. Flasog.A.K .Uso de misoprostol en ginecología y obstetricia. 3ed.Tecnoquímicas. República Dominicana; 2013.
26. Hoover O. Canaval Erazo. Uso del misoprostol en Obstetricia y Ginecología. 3 ed. Panamá. Federación latinoamericana de sociedades de obstetricia y ginecología; 2013.



27. Foro Farmacéutico, disponible en:

<http://forofarmacaceutico.blogspot.pe/2008/02/el-aborto-con-medicamentos-uso-de.html>.

28. Misoprostol Sublingual Versus Misoprostol Vaginal para la Maduración Cervical e Inducción del Parto (2014), disponible en:

http://www.repositorio.usac.edu.gt/675/1/05_9483.pdf.

29. Moliner Calderón E, Gómez González P, Fernández Liarte L, Síndrome de Moebius: ¿misoprostol como teratógeno? Notas Clínicas. Barcelona: Unidad de Neonatología; 69(4): 189-192; 2011.

30. Montoya Baltodano C. Uso del Misoprostol en la Inducción del Trabajo de Parto. Revista médica de costa rica y Centroamérica XVIII (597) 207-211 2011.

31. Cabero Roura L. Tratado de Ginecología y Obstetricia. 2ed. España: Editorial Médica Panamericana; 2013.

32. Arthur T. Evans MD. Manual de Obstetricia; 8va ed. Editora Asociada; 2015.

33. Cabero Roura L. Saldívar Rodríguez D. Hemorragias Obstétricas. Barcelona; 2013.



MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: "Nivel de Conocimiento Sobre el uso y efecto Materno-Perinatal del Análogo Semi-sintético de la Prostaglandina E1; en las Internas de Obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" - Huancayo – 2017".

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	METODOLOGIA
<p>PROBLEMA GENERAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿Cuáles el nivel de Conocimiento Sobre el uso y efecto materno-perinatal Del Análogo Semisintético De La Prostaglandina E1; En Las Internas De Obstetricia Del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" - Huancayo – 2017? <p>PROBLEMAS ESPECIFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre el análogo semi-sintético de la prostaglandina E1, en las internas de Obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" - Huancayo – 2017? ¿Cuál es el uso y efecto materno-perinatal del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1 en las internas de Obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" - Huancayo – 2017. 	<p>OBJETIVO GENERAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Determinar el nivel De Conocimiento Sobre El uso y efecto materno-perinatal del Análogo Semisintético De La Prostaglandina E1; En Las Internas De Obstetricia Del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" - Huancayo – 2017. <p>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificar el nivel de conocimientos sobre el análogo semi-sintético de la prostaglandina E1, en las internas de Obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" - Huancayo – 2017. Determinar cuántas internas de obstetricia realizaron el procedimiento el uso y efecto materno-perinatal del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1 en el Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" - Huancayo – 2017. 	<p>HIPOTESIS GENERAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> H1: Las internas de obstetricia conocen sobre el manejo del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1. H0: las internas de obstetricia desconocen sobre el manejo del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1. <p>HIPOTESIS ESPECIFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> H1: Las internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", tienen el conocimiento del efecto materno-perinatal del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1. H0: Las internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", no tienen el conocimiento del efecto materno-perinatal del análogo semi-sintético de la prostaglandina E1. H2: Más del 50% de las internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", realizan el procedimiento con el análogo semi-sintético de la prostaglandina E1. H0: Menos del 50% de las internas de obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", no realizaron el procedimiento con el análogo semi-sintético de la prostaglandina E1. 	<p>VARIABLE DEPENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nivel de conocimiento sobre el uso y efecto materno-perinatal sobre el análogo semi-sintético de la prostaglandina E1. <p>VARIABLE INDEPENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Internas de obstetricia <p>VARIABLE INTERVINIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" 	<p>MÉTODO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inductivo Descriptivo Transversal Prospectivo <p>DISEÑO DE INVESTIGACIÓN(científico)</p> <ul style="list-style-type: none"> No experimental <p>POBLACIÓN:</p> <p>El 100% de internas de diferentes especialidades de salud que acepten participar en la investigación</p> <p>MUESTRA:</p> <p>Fueron seleccionadas todas a las internas de obstetricia que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Total de muestra fue 30.</p> <p>TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:</p> <p>Se utilizará un cuestionario de veinte preguntas el cuál será previamente validado por seis expertos.</p>



CAPITULO X

X.- ANEXOS.-

10.1. Encuesta:



UNIVERSIDAD PRIVADA “Franklin Roosevelt”



“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” - HUANCAYO – 2017”.

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

1.- ¿Conoces el Misoprostol?

- a) SI
- b) NO

2.- ¿Cuál es la clasificación del fármaco (misoprostol)?

- a) Antibiótico
- b) Oxitócico
- c) Antimicótico
- d) Análogo Prostaglandina E1

3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?

- a) Vía sublingual



- b) Vía rectal
- c) Vía oral
- d) Vía vaginal

4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?

- a) Vómitos/ fiebre
- b) Prurito
- c) Tinnitus
- d) Pérdida de peso

5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?

- a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
- b) Embarazo gemelar
- c) Inducción de trabajo de parto
- d) Hipertensión arterial

6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?

- a) Provoca dolor en el estómago
- b) Provocar el aborto
- c) Provoca placer sexual
- d) Provoca estrés

7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?

- a) Amigos
- b) Internet



c) Farmacias

d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

a) SI

b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

a) Cesáreas anteriores

b) Estrechez pélvica

c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.

d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicarías misoprostol?

a) Embarazo no planificado.

b) Embarazo por violación

c) Embarazo con malformaciones congénitas

d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:

a) Exagerados

b) Necesarios

c) No tienen importancia

d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.



- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?

- c) SI
- d) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO

17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI



b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?



- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina



10.2. FOTOS:






















11.3. AUTORIZACIÓN:



N°

FORMULARIO ÚNICO DE TRAMITE

1. SUMILLA SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN.

SEÑOR DIRECTORE DEL HOSPITAL "EL CARMEN":

2. SOLICITANTE

DE LA PEÑA MARTINEZ MIRYAM LISSETHE
Apellidos y Nombres

EGRESADA DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA
Cargo, Profesión, Oficina u Otro

47588772

N° D.N.I. ó L.E.

PROLONGACIÓN HUAYLLO # 569 - HYO

DOMICILIO

3. SOLICITA

Autorización para la ejecución del proyecto de investigación para la
TITULACIÓN EN OBSTETRICIA.

4. ADJUNTA (FOLIOS: 08)

- Cartula
- Matriz de consistencia
- Operacionalización de variables
- Instrumento de recolección de datos



5. 27-04-2017
FECHA

[Signature]
FIRMA

N° DE EXPEDIENTE: _____ FECHA _____

FOLIOS: _____



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

SOLICITO:

**AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE
LA ENCUESTA DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN.**

SEÑOR:

DR.

DIRECTOR DEL HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN"

Yo **MIRYAM LISSETHE DE LA PEÑA MARTINEZ**, de la universidad Universidad Privada "Franklin Roosevelt" de la Escuela Profesional De Obstetricia, con DNI N° 47588772, domiciliada en Prolongación Huánuco N° 569 – Huancayo, ante usted me presento y le solicito tenga a bien a autorizar a quien corresponda me permita **realizar la encuesta a las internas de obstetricia para recolección de datos**, para ejecutar el proyecto que tiene como título: **"Nivel De Conocimiento Sobre El Uso Y Efecto Materno-Perinatal Del Análogo Semisintético De La Prostaglandina E1; En Las Internas De Obstetricia Del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" - Huancayo – 2017"**, a realizar el día 18 y 19 de Mayo del presente Año, a Horas 11:30 am.

Es cuanto tengo que solicitarle.

Huancayo 13 de Mayo del 2017

Atentamente,

MIRYAM LISSETHE DE LA PEÑA MARTINEZ



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN.

SEÑOR:

COORDINADORA DE INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DOCENTE MATERNO
INFANTIL "EL CARMEN"

Yo **MIRYAM LISSETHE DE LA PEÑA MARTINEZ**, de la universidad Universidad Privada "Franklin Roosevelt" de la Escuela Profesional De Obstetricia, con DNI N° 47588772, domiciliada en Prolongación Huánuco N° 569 – Huancayo, ante usted me presento y le solicito tenga a bien a autorizar a quien corresponda me permita **realizar la investigación y recolectar información** en la institución la que dirige, para ejecutar el proyecto "**Nivel De Conocimiento Sobre El Uso Y Efecto Materno-Perinatal Del Análogo Semisintético De La Prostaglandina E1; En Las Internas De Obstetricia Del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" - Huancayo – 2017**", para obtener el TÍTULO DE OBSTETRA, así mismo resaltar que es una institución especialista y docente, por lo cual es el interés de realizar la investigación en la institución.

Es cuanto tengo que solicitarle.

Huancayo 24 de abril del 2017

Atentamente,

MIRYAM LISSETHE DE LA PEÑA MARTINEZ



PROVEIDO N° 042-2017-GRJ-DRSJ-HRDMIEC-OADI.

AL : Est. MIRYAM LISSETHE DE LA PEÑA MARTINEZ
DE : Jefe Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación
ASUNTO : Autorización Trabajo investigación.
FECHA : Huancayo 10 de Mayo del 2017

Visto el Informe N° 290-2017-GRJ-DRSJ-HRDMIEC-SERV.OBST, presentado por la Jefatura del Servicio de Obstetricia, quien opinan favorablemente el desarrollo del trabajo de investigación NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO PERINATAL DEL ANALOGO SEMISINTETICO DE LA PROSTAGLANDINA E1, EN LAS INTERNAS DEL HRDMI EC CARMEN -2017, por la estudiante MIRYAM LISSETHE DE LA PEÑA MARTINEZ de la especialidad de Obstetricia de la Universidad Privada de Huancayo FRANKLIN ROOSEVELT, se autoriza el desarrollo del trabajo en mención.

Atentamente,

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
MATERNO INFANTIL "EL CARMEN"

Lic. Adm. CAROLINA HUATUCO LAURA
JEFE (E) OFICINA APOYO DOCENCIA E
INVESTIGACION

CHL/chl.
C.c. Archivo.

DOC.	2064765
EXP.	1405553

11.4. VALIDACIÓN:

PROMEDIO DE VALORACIÓN

88

OPINIÓN DE APLICABILIDAD

a) Deficiente b) Baja c) Regular d) Buena e) ~~Muy buena~~

Nombres y apellidos: ... LUISA ... MORESTA ... VALEBIO VEGA

DNI N°: ... 19845437 ... Teléfono/Celular: ... 950459782

Dirección domiciliaria: Av. GUTAMIENTO 935 Urb. Alborada - Tarma

Título profesional: OBSTETRA

Grado académico: Magister

Mención: "GESTION EN SERVICIOS DE SALUD"

HOSPITAL REGIONAL DOCTOR
MATERNO INFANTIL "EL CARMEN"
Valerio P. Buisa M.
OBSTETRA
COP N° 1577
LUGAR Y FECHA: Huancayo 30/03/17

PROMEDIO DE VALORACIÓN

79

OPINIÓN DE APLICABILIDAD

a) Deficiente b) Baja c) Regular d) Buena e) Muy buena

Nombres y apellidos: Elva Idalia Ambrosio Salvador

DNI N°: 41218007 Teléfono/Celular: 962606082

Dirección domiciliaria: Av. Ricardo Palma s/n Sapallanga

Título profesional: Obstetra

Grado académico: Magister

Mención: Administración y Gerencia en Salud



LUGAR Y FECHA: Huancayo 03 de Abril del 2017

PROMEDIO DE VALORACIÓN

5

OPINIÓN DE APLICABILIDAD

a) Deficiente b) Baja c) Regular **d) Buena** e) Muy buena

Nombres y apellidos: Yanis Leonora Rosales Santillana
DNI N°: 20053150 Teléfono/Celular: 959400934
Dirección domiciliaria: Va. Balva # 324 - Concepción
Título profesional: Obstetra
Grado académico: Doctor
Mención: Salud Pública

FIRMA

LUGAR Y FECHA: Huyo 13-04-14



PROMEDIO DE VALORACIÓN

88

OPINIÓN DE APLICABILIDAD

a) Deficiente b) Baja c) Regular d) Buena e) Muy buena

Nombres y apellidos: ISABEL M. CIFUENTES PECHO
DNI N°: 19863900 Teléfono/Celular: 964791363
Dirección domiciliaria: Jr. Los Alisos N° 201
Título profesional: Obstetra
Grado académico: Magister
Mención: Gestión Servicios de Salud

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
MATERNO INFANTIL "EL CARMEN"
Cifuentes Pecho Isabel
OBSTETRA
COP N° 2381

FIRMA

LUGAR Y FECHA: HYO 05-04-2017



ENCUESTAS APLICADAS



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 a) SI
 b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 a) Antibiótico
 b) Oxitócico
 c) Antimicótico
 d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 a) Vía sublingual
 b) Vía rectal
 c) Vía oral
 d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 a) Vómitos/ fiebre
 b) Prurito
 c) Tinitus
 d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 b) Embarazo gemelar
 c) Inducción de trabajo de parto
 d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 a) Provoca dolor en el estómago
 b) Provocar el aborto
 c) Provoca placer sexual
 d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 a) Amigos

- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 a) SI
 b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 a) Cesáreas anteriores
 b) Estrechez pélvica
 c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicarias misoprostol?
 a) Embarazo no planificado.
 b) Embarazo por violación
 c) Embarazo con malformaciones congénitas
 d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 a) Exagerados
 b) Necesarios
 c) No tienen importancia
 d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 c) SI
 d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecanismos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 a) SI
 b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 a) SI
 b) NO
- 16.- ¿Estarias de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 a) SI
 b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprotol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Mitch



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO – 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

1.- ¿Conoce el Misoprostol?

- a) SI
- b) NO

2.- ¿Qué es el misoprostol?

- a) Antibiótico
- b) Oxitócico
- c) Antimicótico
- d) Análogo Prostaglandina E1

3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?

- a) Vía sublingual
- b) Vía rectal
- c) Vía oral
- d) Vía vaginal

4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?

- a) Vómitos/ fiebre
- b) Prurito
- c) Tinitus
- d) Pérdida de peso

5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?

- a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
- b) Embarazo gemelar
- c) Inducción de trabajo de parto
- d) Hipertensión arterial

6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?

- a) Provoca dolor en el estómago
- b) Provocar el aborto
- c) Provoca placer sexual
- d) Provoca estrés

7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?

- a) Amigos



- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

- a) SI
- b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

- a) Cesáreas anteriores
- b) Estrechez pélvica
- c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
- d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?

- a) Embarazo no planificado.
- b) Embarazo por violación
- c) Embarazo con malformaciones congénitas
- d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:

- a) Exagerados
- b) Necesarios
- c) No tienen importancia
- d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

- a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?

- c) SI
- d) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 a) SI
 b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
a) Antibiótico
b) Oxitócico
c) Antimicótico
 d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
a) Vía sublingual
 b) Vía rectal
c) Vía oral
d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 a) Vómitos/ fiebre
b) Prurito
c) Tinnitus
d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 b) Embarazo gemelar
c) Inducción de trabajo de parto
d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
a) Provoca dolor en el estómago
 b) Provocar el aborto
c) Provoca placer sexual
d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
a) Amigos



- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

- a) SI
- b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

- a) Cesáreas anteriores
- b) Estrechez pélvica
- c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
- d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?

- a) Embarazo no planificado.
- b) Embarazo por violación
- c) Embarazo con malformaciones congénitas
- d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:

- a) Exagerados
- b) Necesarios
- c) No tienen importancia
- d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

- a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?

- c) SI
- d) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Cytotec



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

1.- ¿Conoce el Misoprostol?

- a) SI
- b) NO

2.- ¿Qué es el misoprostol?

- a) Antibiótico
- b) Oxitócico
- c) Antimicótico
- d) Análogo Prostaglandina E1

3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?

- a) Vía sublingual
- b) Vía rectal
- c) Vía oral
- d) Vía vaginal

4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?

- a) Vómitos/ fiebre
- b) Prurito
- c) Tinitus
- d) Pérdida de peso

5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?

- a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
- b) Embarazo gemelar
- c) Inducción de trabajo de parto
- d) Hipertensión arterial

6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?

- a) Provoca dolor en el estómago
- b) Provocar el aborto
- c) Provoca placer sexual
- d) Provoca estrés

7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?

- a) Amigos



- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

- a) SI
- b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

- a) Cesáreas anteriores
- b) Estrechez pélvica
- c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
- d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?

- a) Embarazo no planificado.
- b) Embarazo por violación
- c) Embarazo con malformaciones congénitas
- d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:

- a) Exagerados
- b) Necesarios
- c) No tienen importancia
- d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

- a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?

- c) SI
- d) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

1) Cytotec



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 a) SI
 b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
a) Antibiótico
b) Oxitócico
c) Antimicótico
 d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
a) Vía sublingual
b) Vía rectal
c) Vía oral
 d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 a) Vómitos/ fiebre
b) Prurito
c) Tinitus
d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 b) Embarazo gemelar
c) Inducción de trabajo de parto
d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
a) Provoca dolor en el estómago
 b) Provocar el aborto
c) Provoca placer sexual
d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
a) Amigos



- a) Internet
c) Farmacias
d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
a) SI
 b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
a) Cesáreas anteriores
b) Estrechez pélvica
 c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicarias misoprostol?
a) Embarazo no planificado.
b) Embarazo por violación
 c) Embarazo con malformaciones congénitas
d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
a) Exagerados
 b) Necesarios
c) No tienen importancia
d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 a) SI
b) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 a) SI
b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 a) SI
b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 a) SI
b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 a) SI
 b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 a) Antibiótico
 b) Oxitócico
 c) Antimicótico
 d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 a) Vía sublingual
 b) Vía rectal
 c) Vía oral
 d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 a) Vómitos/ fiebre
 b) Prurito
 c) Tinnitus
 d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 b) Embarazo gemelar
 c) Inducción de trabajo de parto
 d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 a) Provoca dolor en el estómago
 b) Provocar el aborto
 c) Provoca placer sexual
 d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 a) Amigos
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 a) SI
 b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 a) Cesáreas anteriores
 b) Estrechez pélvica
 c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicarias misoprostol?
 a) Embarazo no planificado.
 b) Embarazo por violación
 c) Embarazo con malformaciones congénitas
 d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 a) Exagerados
 b) Necesarios
 c) No tienen importancia
 d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 c) SI
 d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 a) SI
 b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 a) SI
 b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 a) SI
 b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Handwritten signature



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 a) SI
 b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 a) Antibiótico
 b) Oxitócico
 c) Antimicótico
 d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 a) Vía sublingual
 b) Vía rectal
 c) Vía oral
 d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 a) Vómitos/ fiebre
 b) Prurito
 c) Tinitus
 d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 b) Embarazo gemelar
 c) Inducción de trabajo de parto
 d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 a) Provoca dolor en el estómago
 b) Provocar el aborto
 c) Provoca placer sexual
 d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 a) Amigos



- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

- a) SI
- b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

- a) Cesáreas anteriores
- b) Estrechez pélvica
- c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
- d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?

- a) Embarazo no planificado.
- b) Embarazo por violación
- c) Embarazo con malformaciones congénitas
- d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:

- a) Exagerados
- b) Necesarios
- c) No tienen importancia
- d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

- a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?

- a) SI
- b) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecanismos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 a) SI
 b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 a) Antibiótico
 b) Oxitócico
 c) Antimicótico
 d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 a) Vía sublingual
 b) Vía rectal
 c) Vía oral
 d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 a) Vómitos/ fiebre
 b) Prurito
 c) Tinitus
 d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 b) Embarazo gemelar
 c) Inducción de trabajo de parto
 d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 a) Provoca dolor en el estómago
 b) Provocar el aborto
 c) Provoca placer sexual
 d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 a) Amigos



- b) Internet
 c) Farmacias
 d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 a) SI
 b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 a) Cesáreas anteriores
 b) Estrechez pélvica
 c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicarias misoprostol?
 a) Embarazo no planificado.
 b) Embarazo por violación
 c) Embarazo con malformaciones congénitas
 d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 a) Exagerados
 b) Necesarios
 c) No tienen importancia
 d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 c) SI
 d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 a) SI
 b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 a) SI
 b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 a) SI
 b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Cytotec



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 a) SI
 b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 a) Antibiótico
 b) Oxitócico
 c) Antimicótico
 d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 a) Vía sublingual
 b) Vía rectal
 c) Vía oral
 d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 a) Vómitos/ fiebre
 b) Prurito
 c) Tinitus
 d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 b) Embarazo gemelar
 c) Inducción de trabajo de parto
 d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 a) Provoca dolor en el estómago
 b) Provocar el aborto
 c) Provoca placer sexual
 d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 a) Amigos
 b) Internet
 c) Farmacias
 d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 a) SI
 b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 a) Cesáreas anteriores
 b) Estrechez pélvica
 c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 a) Embarazo no planificado.
 b) Embarazo por violación
 c) Embarazo con malformaciones congénitas
 d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 a) Exagerados
 b) Necesarios
 c) No tienen importancia
 d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 a) SI
 b) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 a) SI
 b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 a) SI
 b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 a) SI
 b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 a) SI
 b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 a) Antibiótico
 b) Oxitócico
 c) Antimicótico
 d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 a) Vía sublingual
 b) Vía rectal
 c) Vía oral
 d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 a) Vómitos/ fiebre
 b) Prurito
 c) Tinitus
 d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 b) Embarazo gemelar
 c) Inducción de trabajo de parto
 d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 a) Provoca dolor en el estómago
 b) Provocar el aborto
 c) Provoca placer sexual
 d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 a) Amigos



- b) Internet
 c) Farmacias
 d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 a) SI
 b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 a) Cesáreas anteriores
 b) Estrechez pélvica
 c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 a) Embarazo no planificado.
 b) Embarazo por violación
 c) Embarazo con malformaciones congénitas
 d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 a) Exagerados
 b) Necesarios
 c) No tienen importancia
 d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 a) SI
 d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 a) SI
 b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 a) SI
 b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 a) SI
 b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Jupato



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO – 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras.

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 a) SI
 b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 a) Antibiótico
 b) Oxitócico
 c) Antimicótico
 d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 a) Vía sublingual
 b) Vía rectal
 c) Vía oral
 d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 a) Vómitos/ fiebre
 b) Prurito
 c) Tinnitus
 d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 b) Embarazo gemelar
 c) Inducción de trabajo de parto
 d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 a) Provoca dolor en el estómago
 b) Provocar el aborto
 c) Provoca placer sexual
 d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 a) Amigos



- b) Internet
 c) Farmacias
 d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 a) SI
 b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 a) Cesáreas anteriores
 b) Estrechez pélvica
 c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 a) Embarazo no planificado.
 b) Embarazo por violación
 c) Embarazo con malformaciones congénitas
 d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol le parecen:
 a) Exagerados
 b) Necesarios
 c) No tienen importancia
 d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 c) SI
 d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 a) SI
 b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 a) SI
 b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 a) SI
 b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 - a) SI
 - b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 - a) Antibiótico
 - b) Oxitócico
 - c) Antimicótico
 - d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 - a) Vía sublingual
 - b) Vía rectal
 - c) Vía oral
 - d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 - a) Vómitos/ fiebre
 - b) Prurito
 - c) Tinitus
 - d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 - b) Embarazo gemelar
 - c) Inducción de trabajo de parto
 - d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Provoca dolor en el estómago
 - b) Provocar el aborto
 - c) Provoca placer sexual
 - d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 - a) Amigos



- b) Internet
 - c) Farmacias
 - d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 - a) SI
 - b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 - a) Cesáreas anteriores
 - b) Estrechez pélvica
 - c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 - d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 - a) Embarazo no planificado.
 - b) Embarazo por violación
 - c) Embarazo con malformaciones congénitas
 - d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 - a) Exagerados
 - b) Necesarios
 - c) No tienen importancia
 - d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 - a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 - b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 - c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 - a) SI
 - b) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 - a) SI
 - b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 - a) SI
 - b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 - a) SI
 - b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO – 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 - a) SI
 - b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 - a) Antibiótico
 - b) Oxitócico
 - c) Antimicótico
 - d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 - a) Vía sublingual
 - b) Vía rectal
 - c) Vía oral
 - d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 - a) Vómitos/ fiebre
 - b) Prurito
 - c) Tinitus
 - d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 - b) Embarazo gemelar
 - c) Inducción de trabajo de parto
 - d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Provoca dolor en el estómago
 - b) Provocar el aborto
 - c) Provoca placer sexual
 - d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 - a) Amigos



- b) Internet
 - c) Farmacias
 - d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 - a) SI
 - b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 - a) Cesáreas anteriores
 - b) Estrechez pélvica
 - c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 - d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 - a) Embarazo no planificado.
 - b) Embarazo por violación
 - c) Embarazo con malformaciones congénitas
 - d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 - a) Exagerados
 - b) Necesarios
 - c) No tienen importancia
 - d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 - a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 - b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 - c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 - a) SI
 - d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 - a) SI
 - b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 - a) SI
 - b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 - a) SI
 - b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Cytotec



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 - a) SI
 - b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 - a) Antibiótico
 - b) Oxitócico
 - c) Antimicótico
 - d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 - a) Vía sublingual
 - b) Vía rectal
 - c) Vía oral
 - d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 - a) Vómitos/ fiebre
 - b) Prurito
 - c) Tinnitus
 - d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 - b) Embarazo gemelar
 - c) Inducción de trabajo de parto
 - d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Provoca dolor en el estómago
 - b) Provocar el aborto
 - c) Provoca placer sexual
 - d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 - a) Amigos
 - b) Internet
 - c) Farmacias
 - d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 - a) SI
 - b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 - a) Cesáreas anteriores
 - b) Estrechez pélvica
 - c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 - d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 - a) Embarazo no planificado.
 - b) Embarazo por violación
 - c) Embarazo con malformaciones congénitas
 - d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 - a) Exagerados
 - b) Necesarios
 - c) No tienen importancia
 - d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 - a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 - b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 - c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado o indicado misoprostol como inductor del aborto?
 - c) SI
 - d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecanismos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 - a) SI
 - b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 - a) SI
 - b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 - a) SI
 - b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 - a) SI
 - b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 - a) Antibiótico
 - b) Oxitócico
 - c) Antimicótico
 - d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 - a) Vía sublingual
 - b) Vía rectal
 - c) Vía oral
 - d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 - a) Vómitos/ fiebre
 - b) Prurito
 - c) Tinitus
 - d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 - b) Embarazo gemelar
 - c) Inducción de trabajo de parto
 - d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Provoca dolor en el estómago
 - b) Provocar el aborto
 - c) Provoca placer sexual
 - d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 - a) Amigos
 - b) Internet
 - c) Farmacias
 - d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 - a) SI
 - b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 - a) Cesáreas anteriores
 - b) Estrechez pélvica
 - c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 - d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 - a) Embarazo no planificado.
 - b) Embarazo por violación
 - c) Embarazo con malformaciones congénitas
 - d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 - a) Exagerados
 - b) Necesarios
 - c) No tienen importancia
 - d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 - a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 - b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 - c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 - c) SI
 - d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 - a) SI
 - b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 - a) SI
 - b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 - a) SI
 - b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO – 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

1.- ¿Conoce el Misoprostol?

- a) SI
- b) NO

2.- ¿Qué es el misoprostol?

- a) Antibiótico
- b) Oxitócico
- c) Antimicótico
- d) Análogo Prostaglandina E1

3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?

- a) Vía sublingual
- b) Vía rectal
- c) Vía oral
- d) Vía vaginal

4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?

- a) Vómitos/ fiebre
- b) Prurito
- c) Tinitus
- d) Pérdida de peso

5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?

- a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
- b) Embarazo gemelar
- c) Inducción de trabajo de parto
- d) Hipertensión arterial

6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?

- a) Provoca dolor en el estómago
- b) Provocar el aborto
- c) Provoca placer sexual
- d) Provoca estrés

7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?

- a) Amigos



- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

- a) SI
- b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

- a) Cesáreas anteriores
- b) Estrechez pélvica
- c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
- d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?

- a) Embarazo no planificado.
- b) Embarazo por violación
- c) Embarazo con malformaciones congénitas
- d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:

- a) Exagerados
- b) Necesarios
- c) No tienen importancia
- d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

- a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?

- c) SI
- d) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 - a) SI
 - b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 - a) Antibiótico
 - b) Oxitócico
 - c) Antimicótico
 - d) Análogo Prostaglandina E1.
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 - a) Vía sublingual
 - b) Vía rectal
 - c) Vía oral
 - d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 - a) Vómitos/ fiebre
 - b) Prurito
 - c) Tinnitus
 - d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 - b) Embarazo gemelar.
 - c) Inducción de trabajo de parto
 - d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Provoca dolor en el estómago
 - b) Provocar el aborto
 - c) Provoca placer sexual
 - d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 - a) Amigos
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 - a) SI
 - b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 - a) Cesáreas anteriores
 - b) Estrechez pélvica
 - c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 - d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 - a) Embarazo no planificado.
 - b) Embarazo por violación.
 - c) Embarazo con malformaciones congénitas
 - d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 - a) Exagerados.
 - b) Necesarios
 - c) No tienen importancia
 - d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 - a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 - b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 - c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 - c) SI
 - d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 - a) SI
 - b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 - a) SI
 - b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 - a) SI
 - b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Handwritten signature



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 - a) SI
 - b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 - a) Antibiótico
 - b) Oxitócico
 - c) Antimicótico
 - d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 - a) Vía sublingual
 - b) Vía rectal
 - c) Vía oral
 - d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 - a) Vómitos/ fiebre
 - b) Prurito
 - c) Tinitus
 - d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 - b) Embarazo gemelar
 - c) Inducción de trabajo de parto
 - d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Provoca dolor en el estómago
 - b) Provocar el aborto
 - c) Provoca placer sexual
 - d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 - a) Amigos
 - b) Internet
 - c) Farmacias
 - d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 - a) SI
 - b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 - a) Cesáreas anteriores
 - b) Estrechez pélvica
 - c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 - d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 - a) Embarazo no planificado.
 - b) Embarazo por violación
 - c) Embarazo con malformaciones congénitas
 - d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol le parecen:
 - a) Exagerados
 - b) Necesarios
 - c) No tienen importancia
 - d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 - a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 - b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 - c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 - c) SI
 - d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecanismos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 - a) SI
 - b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 - a) SI
 - b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 - a) SI
 - b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaria utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO – 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 - a) SI
 - b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 - a) Antibiótico
 - b) Oxitócico
 - c) Antimicótico
 - d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 - a) Vía sublingual
 - b) Vía rectal
 - c) Vía oral
 - d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 - a) Vómitos/ fiebre
 - b) Prurito
 - c) Tinnitus
 - d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 - b) Embarazo gemelar
 - c) Inducción de trabajo de parto
 - d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Provoca dolor en el estómago
 - b) Provocar el aborto
 - c) Provoca placer sexual
 - d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 - a) Amigos
 - b) Internet
 - c) Farmacias
 - d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 - a) SI
 - b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 - a) Cesáreas anteriores
 - b) Estrechez pélvica
 - c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 - d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 - a) Embarazo no planificado.
 - b) Embarazo por violación
 - c) Embarazo con malformaciones congénitas
 - d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 - a) Exagerados
 - b) Necesarios
 - c) No tienen importancia
 - d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 - a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 - b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 - c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 - a) SI
 - b) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 - a) SI
 - b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 - a) SI
 - b) NO
- 16.- ¿Estaría de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 - a) SI
 - b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cypristol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Fredy Cardenas C.



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 a) SI
 b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
a) Antibiótico
b) Oxitócico
c) Antimicótico
 d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
a) Vía sublingual
 b) Vía rectal
c) Vía oral
d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 a) Vómitos/ fiebre
b) Prurito
c) Tinitus
d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 b) Embarazo gemelar
c) Inducción de trabajo de parto
d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
a) Provoca dolor en el estómago
 b) Provocar el aborto
c) Provoca placer sexual
d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
a) Amigos

- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

- a) SI
- b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

- a) Cesáreas anteriores
- b) Estrechez pélvica
- c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
- d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?

- a) Embarazo no planificado.
- b) Embarazo por violación
- c) Embarazo con malformaciones congénitas
- d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol le parecen:

- a) Exagerados
- b) Necesarios
- c) No tienen importancia
- d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

- a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado o indicado misoprostol como inductor del aborto?

- a) SI
- b) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

1.- ¿Conoce el Misoprostol?

- a) SI
- b) NO

2.- ¿Qué es el misoprostol?

- a) Antibiótico
- b) Oxitócico
- c) Antimicótico
- d) Análogo Prostaglandina E1

3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?

- a) Vía sublingual
- b) Vía rectal
- c) Vía oral
- d) Vía vaginal

4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?

- a) Vómitos/ fiebre
- b) Prurito
- c) Tinitus
- d) Pérdida de peso

5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?

- a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
- b) Embarazo gemelar
- c) Inducción de trabajo de parto
- d) Hipertensión arterial

6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?

- a) Provoca dolor en el estómago
- b) Provocar el aborto
- c) Provoca placer sexual
- d) Provoca estrés

7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?

- a) Amigos

- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

- a) SI
- b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

- a) Cesáreas anteriores
- b) Estrechez pélvica
- c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
- d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?

- a) Embarazo no planificado.
- b) Embarazo por violación
- c) Embarazo con malformaciones congénitas
- d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol le parecen:

- a) Exagerados
- b) Necesarios
- c) No tienen importancia
- d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

- a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?

- c) SI
- d) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecanismos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estaría de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Prof. Dr. Rafael C. C. C.



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 - a) SI
 - b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 - a) Antibiótico
 - b) Oxitócico
 - c) Antimicótico
 - d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 - a) Vía sublingual
 - b) Vía rectal
 - c) Vía oral
 - d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 - a) Vómitos/ fiebre
 - b) Prurito
 - c) Tinitus
 - d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 - b) Embarazo gemelar
 - c) Inducción de trabajo de parto
 - d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Provoca dolor en el estómago
 - b) Provocar el aborto
 - c) Provoca placer sexual
 - d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 - a) Amigos
 - b) Internet
 - c) Farmacias
 - d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 - a) SI
 - b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 - a) Cesáreas anteriores
 - b) Estrechez pélvica
 - c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 - d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 - a) Embarazo no planificado.
 - b) Embarazo por violación
 - c) Embarazo con malformaciones congénitas
 - d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 - a) Exagerados
 - b) Necesarios
 - c) No tienen importancia
 - d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 - a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 - b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 - c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 - a) SI
 - b) NO
 - c) SI
 - d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 - a) SI
 - b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 - a) SI
 - b) NO
- 16.- ¿Estaría de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 - a) SI
 - b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

~~NO~~ SI
SI

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- ~~c) Cytotec~~
- d) Mesygina

Vanessa Salgado



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

1.- ¿Conoce el Misoprostol?

- a) SI
- b) NO

2.- ¿Qué es el misoprostol?

- a) Antibiótico
- b) Oxitócico
- c) Antimicótico
- d) Análogo Prostaglandina E1

3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?

- a) Vía sublingual
- b) Vía rectal
- c) Vía oral
- d) Vía vaginal

4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?

- a) Vómitos/ fiebre
- b) Prurito
- c) Tinitus
- d) Pérdida de peso

5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?

- a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
- b) Embarazo gemelar
- c) Inducción de trabajo de parto
- d) Hipertensión arterial

6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?

- a) Provoca dolor en el estómago
- b) Provocar el aborto
- c) Provoca placer sexual
- d) Provoca estrés

7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?

- a) Amigos

- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

- a) SI
- b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

- a) Cesáreas anteriores
- b) Estrechez pélvica
- c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
- d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?

- a) Embarazo no planificado.
- b) Embarazo por violación
- c) Embarazo con malformaciones congénitas
- d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:

- a) Exagerados
- b) Necesarios
- c) No tienen importancia
- d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

- a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?

- c) SI
- d) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecanismos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Franklin



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras.

1.- ¿Conoce el Misoprostol?

- a) SI
- b) NO

2.- ¿Qué es el misoprostol?

- a) Antibiótico
- b) Oxitócico
- c) Antimicótico
- d) Análogo Prostaglandina E1

3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?

- a) Vía sublingual
- b) Vía rectal
- c) Vía oral
- d) Vía vaginal

4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?

- a) Vómitos/ fiebre
- b) Prurito
- c) Tinitus
- d) Pérdida de peso

5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?

- a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
- b) Embarazo gemelar
- c) Inducción de trabajo de parto
- d) Hipertensión arterial

6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?

- a) Provoca dolor en el estómago
- b) Provocar el aborto
- c) Provoca placer sexual
- d) Provoca estrés

7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?

- a) Amigos



- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

- a) SI
- b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

- a) Cesáreas anteriores
- b) Estrechez pélvica
- c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
- d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?

- a) Embarazo no planificado.
- b) Embarazo por violación
- c) Embarazo con malformaciones congénitas
- d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:

- a) Exagerados
- b) Necesarios
- c) No tienen importancia
- d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

- a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?

- c) SI
- d) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Mabel Rodríguez



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 - a) SI
 - b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 - a) Antibiótico
 - b) Oxitócico
 - c) Antimicótico
 - d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 - a) Vía sublingual
 - b) Vía rectal
 - c) Vía oral
 - d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 - a) Vómitos/ fiebre
 - b) Prurito
 - c) Tinnitus
 - d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 - b) Embarazo gemelar
 - c) Inducción de trabajo de parto
 - d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 - a) Provoca dolor en el estómago
 - b) Provocar el aborto
 - c) Provoca placer sexual
 - d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 - a) Amigos



- b) Internet
 - c) Farmacias
 - d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 - a) SI
 - b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 - a) Cesáreas anteriores
 - b) Estrechez pélvica
 - c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 - d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicarias misoprostol?
 - a) Embarazo no planificado.
 - b) Embarazo por violación
 - c) Embarazo con malformaciones congénitas
 - d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 - a) Exagerados
 - b) Necesarios
 - c) No tienen importancia
 - d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 - a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 - b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 - c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 - c) SI
 - d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 - a) SI
 - b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 - a) SI
 - b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 - a) SI
 - b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Héctor



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 a) SI
 b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 a) Antibiótico
 b) Oxitócico
 c) Antimicótico
 d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 a) Vía sublingual
 b) Vía rectal
 c) Vía oral
 d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 a) Vómitos/ fiebre
 b) Prurito
 c) Tinitus
 d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 b) Embarazo gemelar
 c) Inducción de trabajo de parto
 d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 a) Provoca dolor en el estómago
 b) Provocar el aborto
 c) Provoca placer sexual
 d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 a) Amigos



- b) Internet
 c) Farmacias
 d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 a) SI
 b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 a) Cesáreas anteriores
 b) Estrechez pélvica
 c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 a) Embarazo no planificado.
 b) Embarazo por violación
 c) Embarazo con malformaciones congénitas
 d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:
 a) Exagerados
 b) Necesarios
 c) No tienen importancia
 d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 c) SI
 d) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 a) SI
 b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 a) SI
 b) NO
- 16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 a) SI
 b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

J. Crivello



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO – 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

1.- ¿Conoce el Misoprostol?

- a) SI
- b) NO

2.- ¿Qué es el misoprostol?

- a) Antibiótico
- b) Oxitócico
- c) Antimicótico
- d) Análogo Prostaglandina E1

3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?

- a) Vía sublingual
- b) Vía rectal
- c) Vía oral
- d) Vía vaginal

4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?

- a) Vómitos/ fiebre
- b) Prurito
- c) Tinitus
- d) Pérdida de peso

5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?

- a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
- b) Embarazo gemelar
- c) Inducción de trabajo de parto
- d) Hipertensión arterial

6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?

- a) Provoca dolor en el estómago
- b) Provocar el aborto
- c) Provoca placer sexual
- d) Provoca estrés

7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?

- a) Amigos

- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

- a) SI
- b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

- a) Cesáreas anteriores
- b) Estrechez pélvica
- c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
- d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?

- a) Embarazo no planificado.
- b) Embarazo por violación
- c) Embarazo con malformaciones congénitas
- d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:

- a) Exagerados
- b) Necesarios
- c) No tienen importancia
- d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

- a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?

- a) SI
- b) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Cytotec



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

- 1.- ¿Conoce el Misoprostol?
 a) SI
 b) NO
- 2.- ¿Qué es el misoprostol?
 a) Antibiótico
 b) Oxitócico
 c) Antimicótico
 d) Análogo Prostaglandina E1
- 3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?
 a) Vía sublingual
 b) Vía rectal
 c) Vía oral
 d) Vía vaginal
- 4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?
 a) Vómitos/ fiebre
 b) Prurito
 c) Tinitus
 d) Pérdida de peso
- 5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?
 a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
 b) Embarazo gemelar
 c) Inducción de trabajo de parto
 d) Hipertensión arterial
- 6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?
 a) Provoca dolor en el estómago
 b) Provocar el aborto
 c) Provoca placer sexual
 d) Provoca estrés
- 7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?
 a) Amigos



- b) Internet
 c) Farmacias
 d) Libros
- 8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?
 a) SI
 b) NO
- 9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?
 a) Cesáreas anteriores
 b) Estrechez pélvica
 c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
 d) Embarazo múltiple
- 10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?
 a) Embarazo no planificado.
 b) Embarazo por violación
 c) Embarazo con malformaciones congénitas
 d) Embarazo múltiple
- 11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol le parecen:
 a) Exagerados
 b) Necesarios
 c) No tienen importancia
 d) Poco relevantes
- 12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?
 a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
 b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
 c) Debe ser vendido sin receta médica.
- 13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?
 a) SI
 b) NO
- 14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?
 a) SI
 b) NO
- 15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?
 a) SI
 b) NO
- 16.- ¿Estaría de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?
 a) SI
 b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO – 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

1.- ¿Conoce el Misoprostol?

- a) SI
- b) NO

2.- ¿Qué es el misoprostol?

- a) Antibiótico
- b) Oxitócico
- c) Antimicótico
- d) Análogo Prostaglandina E1

3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?

- a) Vía sublingual
- b) Vía rectal
- c) Vía oral
- d) Vía vaginal

4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?

- a) Vómitos/ fiebre
- b) Prurito
- c) Tinitus
- d) Pérdida de peso

5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?

- a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
- b) Embarazo gemelar
- c) Inducción de trabajo de parto
- d) Hipertensión arterial

6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?

- a) Provoca dolor en el estómago
- b) Provocar el aborto
- c) Provoca placer sexual
- d) Provoca estrés

7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?

- a) Amigos



- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

- a) SI
- b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

- a) Cesáreas anteriores
- b) Estrechez pélvica
- c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
- d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?

- a) Embarazo no planificado.
- b) Embarazo por violación
- c) Embarazo con malformaciones congénitas
- d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:

- a) Exagerados
- b) Necesarios
- c) No tienen importancia
- d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

- a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?

- a) SI
- d) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecánicos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina

Raul Espinoza



UNIVERSIDAD PRIVADA "Franklin Roosevelt"



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO Y EFECTO MATERNO-PERINATAL DEL ANÁLOGO SEMISINTÉTICO DE LA PROSTAGLANDINA E1; EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - 2017".

INSTRUCCIONES: Lea y responda las siguientes preguntas sin enmendaduras

1.- ¿Conoce el Misoprostol?

- a) SI
- b) NO

2.- ¿Qué es el misoprostol?

- a) Antibiótico
- b) Oxitócico
- c) Antimicótico
- d) Análogo Prostaglandina E1

3.- ¿Cuál de las siguientes vías de administración del misoprostol, es la más usada en obstetricia?

- a) Vía sublingual
- b) Vía rectal
- c) Vía oral
- d) Vía vaginal

4.- ¿Cuál es el efecto secundario del misoprostol?

- a) Vómitos/ fiebre
- b) Prurito
- c) Tinitus
- d) Pérdida de peso

5.- ¿Cuál es la contraindicación del misoprostol, en obstetricia?

- a) Tratamiento para las hemorragias post-parto
- b) Embarazo gemelar
- c) Inducción de trabajo de parto
- d) Hipertensión arterial

6.- ¿Cuál es el riesgo del uso del misoprostol, en obstetricia?

- a) Provoca dolor en el estómago
- b) Provocar el aborto
- c) Provoca placer sexual
- d) Provoca estrés

7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información para el conocimiento sobre el uso del misoprostol?

- a) Amigos



- b) Internet
- c) Farmacias
- d) Libros

8.- Usted hizo uso de la administración del misoprostol en abortos frustos con indicación del personal asistencial?

- a) SI
- b) NO

9.- ¿En cuál de estas alternativas se usa el misoprostol, en obstetricia?

- a) Cesáreas anteriores
- b) Estrechez pélvica
- c) Tratamiento de las hemorragias post-parto.
- d) Embarazo múltiple

10.- ¿En cuál de los siguientes casos indicaría misoprostol?

- a) Embarazo no planificado.
- b) Embarazo por violación
- c) Embarazo con malformaciones congénitas
- d) Embarazo múltiple

11.- Los aspectos éticos relacionados al uso de misoprostol te parecen:

- a) Exagerados
- b) Necesarios
- c) No tienen importancia
- d) Poco relevantes

12.- ¿Cuál es tu opinión frente al uso de misoprostol (obstetricia)?

- a) Sirve para el tratamiento de úlceras gástricas.
- b) Debe ser retirado del mercado farmacéutico, por su efecto abortivo.
- c) Debe ser vendido sin receta médica.

13.- ¿Usted se ha enterado de que alguien ha usado ó indicado misoprostol como inductor del aborto?

- a) SI
- d) NO

14.- El misoprostol, tiene como uno de sus mecanismos de acción la maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino?

- a) SI
- b) NO

15.- ¿Usted brindaría más información sobre el misoprostol, ya que la sociedad tiene ideas erróneas?

- a) SI
- b) NO

16.- ¿Estarías de acuerdo a que se diera más información sobre el misoprostol para que luego de su utilización no haya complicaciones?

- a) SI
- b) NO



17.- ¿Usted, Recomendaría utilizar el misoprostol antes de la semana 20 de gestación?

- a) SI
- b) NO

18.- ¿Cuál es la presentación del misoprostol?

- a) Ampollas
- b) Tabletas
- c) Óvulos
- d) Capsulas

19.- ¿En qué dosis viene el misoprostol?

- a) 250 ug
- b) 200 ug
- c) 300 ug
- d) 400 ug

20.- ¿Cuál es su nombre comercial del misoprostol?

- a) Cyprostol
- b) Misotrol
- c) Cytotec
- d) Mesygina